Aqua f. ℥ xij.	۱۲ اونس	ن
Two tablespoonfuls	مقدار دو ٹیبل اسپون فل تھوڑے	
in gruel, thrice daily	کی بچ مین ملاکر تین تین پہر	
	دین ؛	

ہون کے واسطے بکیل ٹیوب کے فرمن امراض مین نسخہات مندرجہ ذیل مفید ہین ؛

℞ نسخہ

Potassi Nitratis, gr xxxvi.	۳۶ گرین	ٹریٹ آف پوٹاشس
Tinct. Conii, f. ℥ ss.	آدھا اونس	چر آف ہملوک
Spt. aeth. nitrosi	چھ ڈرام	رک ایتھر
Oxymellis scillae, āā f. ʒ vi.	۶ ڈرام	ڑ دیکل آف اسکویلس
Decoctum senegae, ad f. ℥ vj. m.	اتنا کہ سب چھ اونس ہوجاوے	کشن آف سینیگا
A tablespoonful thrice daily.	ملاکر ایک ایک ٹیبل اسپون فل دن تین	
	بار دیوین ؛	

نسخہ

Potassi acetatis, ℥ ss.	آدھا اونس	ٹیٹ آف پوٹاشس
Aceti Scillae,	۶ ڈرام	ٹ اسکوئیل
Spt. aether. nitrosi, āā f. ʒ vi.	۶ ڈرام	ک ایتھر
Tinct. opii camphor. f. ℥ ss.	نصف اونس	ٹینکچر آف کیمفر
Liq. ammon. acetat. f. ℥ iii ss.	ساڑھے تین اونس	شن آف ایسیٹیٹ آف امونیا

Syr. aurantii cortic. f. ℨvi. m. — سیرپ آف اورنج پیل ۶ ڈرام
½ tablespoonful — سبکو ملاکر ایک ایک ٹیبل سپون دن مین
thrice daily. — تین بار دین ۔

Dr. Beigel. — ڈاکٹر بیجل صاحب

لاعلاج مریضون مین نسخہ ذیل دواؤن کا انہیلیشن کرنا مفید ہوتا ہے ۔

℞. — نسخہ

Pulv. aluminis, gr. ij. — الم پوڈر ۲ گرین
Tinct. opii, m x. — ٹنکچر آف اوپیم ۱۰ قطرے
Aquae destillat. f. ℥i. m. — ڈسٹلڈ واٹر ایک اونس
For inhalation. — بذریعہ انہیلر کے صبح شام انہیل کرائین ۔

℞. — نوع دیگر

Acidi tannici, gr. iij. — ٹینک ایسڈ ۳ گرین
Ext. hyoscyami, gr. ij. — اکسٹراکٹ آف ہایوسائمس ۲ گرین
Aquae destillat. f. ℥i. m. — ڈسٹلڈ واٹر ایک اونس
For inhalation. — صبح شام انہیل کرائین ۔

Prof. J. M. Da Costa. — ڈاکٹر کاسٹا صاحب

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید جانتے ہین ۔

℞. — نسخہ

Ammonii chloridi, ℨij. — کلورائڈ آف امونیم ۲ ڈرام

Misture glycyrrhiz. f. ℥iij. m. — ...وزکمپیچر آف لکرس ۳ اونس
A dessertspoon-ful three times a day. — ...ایک ڈزرٹ اسپون فل دن میں تین ...دفعہ دین ٭

...سل والے مریضوں کے برنکائٹس میں نسخہ ذیل مفید ہوتا ہے ٭

℞ — نسخہ

Ammon. chlorid. ℥ss. — ...لورائیڈ آف امونیم نصف اونس
Morphiæ muriatis gr. j. — ...یوریٹ آف مارفیا ایک گرین
Ext. pruni Virgin. fluid f. ℥iij. m. — ...وئیڈ اکسٹرکٹ آف پرنس ورجن ۳ اونس
...سب کو ملا کر ایک ٹی اسپون فل دن میں
A tea spoonful thrice daily. — ...تین بار دین ٭

...جب کہ سدا رطوبت نکلتی ہو تو یہ نسخہ مفید ہوتا ہے ٭

℞ — نسخہ

Ammon. Chlorid. ʒij. — ...ورائیڈ آف امونیم ۲ ڈرام
Potassæ chloratis ʒj. — ...ریٹ آف پٹاش ایک ڈرام
Tinct. hyoscyami f. ℥ss. — ...آف ہایوسائمس آدھا اونس
Ext. pruni Virgin. fluid. f. ℥ijss. m. — ...ئیڈ اکسٹرکٹ آف پرنس ورجن ڈھائی اونس
A dessertspoon-ful thrice daily. — ...سب کو ملا کر ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل ...دن تین دفعہ دیں ٭

...کلوریٹ آف پٹاش سے رطوبت پتلی ہو جاتی ہے اور بلغم زیادہ خارج ہوتا ہے

بدبو جو سیہ دوا شدید و مزمن برنکائٹس یعنی دونوں حالتوں مین مفید ہوتی ہے
چنانچہ جب نتھنوں سے خرخراہٹ کی آواز آتی ہے اوس حالت مین یہ نسخہ مفید ہے

℞

نسخہ

Potassæ chloratis, ℥i. — ۲ ڈرام — کلوریٹ آف پٹاش
Tinct. scillæ, f. ℥ss. — نصف اونس — ٹنکچر آف اسکویل
Mixturæ glycyrrhiz. comp. f. ℥iiss. — ڈھائی اونس — کمپونڈ مکسچر آف لکرس
... dessert- m. — سب کو ملا کر ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل
...spoonful three or four times a day — دیجئیے تین دفعہ دن بھر

نسخہ مندرجہ ذیل بھی ایک عمدہ دافع بلغم الکلائین مکسچر ہے جبکہ رطوبت پتلی ہو جاتی ہے

℞

نسخہ

...otassæ Carbonatis ℥ss. — نصف اونس — کاربونیٹ آف پٹاش
...ni ipecacuanhæ, f. ℥ii — ۲ ڈرام — وائن آف اکاکونا
Tinct. Opii campho... — ڈیڑھ ڈرام — ٹنکچر آف ...
...Syr. tolutani, āā — ڈیڑھ ڈرام — ...سیرپ آف ٹولو
... f. ℥iss.
...teaspoon- m. — سب کو ملا کر ایک ایک ٹی اسپون فل تین
...l three times a day. — تین دفعہ دیجئے

...Dr. E. H. Greenhow M.D. — ڈاکٹر گرین ہیو صاحب

عنقریب تمام مریضوں میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ دافع بلغم دواؤں سے کچھ فایدہ نہیں
کیونکہ برنکیل ممبرینز سے بلغم تراوش پانے کی سی عادت ہو جاتی ہے بدبو جیسا حالت

...ٹریتز ابھی خصوصاً نائیٹرو میوری ایٹک ایسڈ ٹنکچر باقی دواؤں کے ساتھ دیتے ہیں ۔

ڈاکٹر میگس صاحب J. F. Meigs, M.D.

...اتے ہیں کہ پھیپھیل گنگارین اور جب پھیپھیں ٹیوب بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہو

...و ہر ایک پائینٹ پانی میں ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک فلوئیڈ کاربولک ایسڈ ملا کر انہیلیشن کرانے

...فائدہ ہوتا ہے ۔

ڈاکٹر اسٹل صاحب Prof. A. Stille, M.D.

...تے ہیں کہ یہ انہیلیشن مفید ہوتا ہے ۔

R. نسخہ

...ڈ کاربولک ایسڈ پندرہ سے بیس قطرے Acidi carbolici fluid. gtt. xv–xx.

...آف ہملوک ایک سے دو اونس Tinct. conii, f ℥i–ij.

...ٹلڈ واٹر دو پائنٹ Aquae destillat, Oij.

...ملا کر انہیلیشن کرائیں ۔ For inhalation.

ڈاکٹر اسٹوک صاحب Prof. W. Stokes, M.D.

...تے ہیں کہ سوزش کی شدت کم ہونے کے بعد نسخہ ہائے ذیل مفید ہیں

R. نسخہ

...ڈ آف پٹاسیم ۲ ڈرام Potassii iodidi, ʒii.

...کر آف کمفر نصف اونس Tinct. opii camph. f ℥ss.

...شن آف سینیگا ۴ اونس Decoct. senegae, f ℥iv.

...پ آف ٹولو ڈیڑھ اونس Syr. tolutani, f ℥iss. M.

شربت کولاٹین اور اسپیج دو ٹی اسپون فل — Two tablespoon-
دن بھر مین دین ؛ — fuls a day.

نوع دیگر

Rx

کمپونڈ ٹنکچر آف کیمفر	نصف اونس	Tinct: Opii Camph. f. ℥ss.
ایتھر	۲ ڈرام	Aetheris,
ٹنکچر ٹولو	۲ ڈرام	Tinct. tolutanae, āā f ʒ ij. M.

بقدر ایک ٹی اسپون فل گرم پیالی کے — A teaspoonful
ساتھ کھانسی کی شدت کم کرنیکو دیتے ہین ؛ — in a warm drink.

نوع دیگر

Rx.

کمپونڈ ٹنکچر آف کیمفر	ڈیڑھ ڈرام	Tinct: Opii Camph.
ٹنکچر آف اسکوئیل	ڈیڑھ ڈرام	Tinct: Scillae, āā f. ʒ iss.
کاربونیٹ آف امونیا	۱۸ گرین	Ammon. Carb. gr 18.
ڈکاکشن [illegible]	[illegible] اونس	Decocti Senegae f. ℥ iv.
[illegible] ٹولو	نصف اونس	Syr. tolutanae f. ℥ss. M.

شربت [illegible] کا اسمین سے دو یا تین ٹی اسپون فل — Two or three
دن بھر مین دین ؛ — tablespoonfuls a day.

مزمن پلمونری کٹار مین بار بار سینہ پر مسٹرڈ پلاستر لگائین اور نسخہ ذیل مین د[illegible]

نسخہ

Rx.

بنزوئک ایسڈ	آدہا ڈرام	Acidi benzoici

Ammoniaci, aa. ʒss. | آدھا ڈرام | امونیاکم
Saponis, q. s. | حسب ضرورت | سوپ
Divide into 20 pills. | سب کو ملا کر بیس گولیاں بنائیں اور چوبیس
From 4 to 8 in 24 hrs. | گھنٹے کے اندر چار سے آٹھ گولی تک کھائیں

J. Turnbull, M. D. ڈاکٹر ٹرنبل صاحب

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید جانتے ہیں

℞ نسخہ

Ipecacuanha, ʒij. | ۲ ڈرام | اپیکاکوانا
Olei olivæ, f. ʒij. | ۲ ڈرام | روغن زیتون
Adipis, ʒiv. | ۴ ڈرام | چربی
M.
Once a twice daily. | سب کو ملائیں اور دوا بی نسٹ کے واسطے ایک یا دو بار لگائیں

Sir T. Watson, London. ڈاکٹر واٹسن صاحب

نوبت آتا ہو تو اسکے کم کرنے اور مریض کی طاقت بڑھانیکے لئے کیونین [illegible]
دینا مفید ہے ۔ اور نبض ہلکی و بدن ٹھنڈا ہو تو دو تین گرین [illegible] اگر
کیونین انفیوزن آف روز کے ساتھ دینے سے فایدہ ہوتا ہے مگر اس دوا کو بخار کی
[illegible] میں نہ دیں کیونکہ اس حالت میں دینے سے بخار زیادہ ہو جاتا ہے

J. Williams, M. D. ڈاکٹر ولیمس صاحب

[illegible] رطوبت کا تھوکنا در بے [illegible] ہو تو یہ نسخہ مفید ہے

نسخہ

℞

امونیاکم	۱۵ گرین	Ammoniaci,
کاربونیٹ آف امونیا	۱۵ گرین	Ammon. Carb. aa gr. xv.
اپیکاکوانا	۴ گرین	Ipecacuanhae, gr. iv.
میوریٹ آف مارفیا	ڈیڑھ گرین	Morphiae, muriat. gr. 1½.
لعاب صمغ عربی	...[illegible]	Mucilaginis acaciae, q. s.

سبکو ملا کر دس گولیان بنائین اور انپر بالسم آف ٹولو و کلوروفارم آمیز کر کے لگائین پھر ایک گولی صبح ایک شام کھلائین ◆

Divide into ten pills, one pill morning & evening.

ڈاکٹر فادرگل صاحب

J. M. Fothergill.

فرماتے ہین کہ اس مرض مین نسخہ ذیل مفید ہے اور بچونکو دینا ہو تو خوراک کم کر دین ◆

℞

نسخہ

اسپرٹ آف [illegible] ڈرام	[illegible]	Sp. Chloroformi m. [illegible]
میوریٹک [illegible] ایسڈ	نصف ڈرام	Hydrobromic acid, ʒss.
سیرپ آف اسکوئل	ایک ڈرام	Syr. Scillae, ʒj.
واٹر اتنا ملاو کہ ایک اونس ہو جاوے		Aquam, ad ℥j.

جوانونکے لئے یہ ایک خوراک ہے ایسی تین تین بار دین ◆

One dose, thrice daily.

بڑا کان لینا [illegible] یا غم صحیح ہو تو آسانی سے نکالے کلوٹنا یا کسی کان کے بیچ مین ملا کر اسے نکلنا یا کا دیتا ہے

جب حلق خشک اور بلغم لیس دار ہو اور سینہ میں جکڑن ہو اور رطوبت نہ نکلتی ہو تو پیکا کرنا ۔
الہ سونٹ آف امونیا کے ساتھ ملا کر دیں اور اسمیں تھوڑی مقدار ٹنکچر کی ملا سکتے ہیں ۔

نیو یارک ہاسپٹل Hospital, New York.

ہسپتال مذکورہ بالا میں نسخہ مندرجہ ذیل کا استعمال ہوتا ہے ۔

℞ نسخہ

Ammon. Carb., gr. 32	۳۲ گرین	کاربونیٹ آف امونیا
Ext. fl. senegae,	ایک ڈرام	فلوئڈ اکسٹراکٹ آف سینیگا
Ext. fl. scillae, aa f. ʒi.	ایک ڈرام	فلوئڈ اکسٹراکٹ آف اسکوئلز
Tr. opii camph. f. ʒvi.	۶ ڈرام	پاراگورک الکسر
Aquae, f. ℥ss	نصف اونس	پانی
Syr. tolut., q. s. ad f ℥iv. M.		سیرپ آف ٹولو اتنا کہ چار اونس ہو جائے ۔

مقدار خوراک ایک ٹی اسپون فل ہے ۔

Biliary Calculus.

بلیری کیل کیولائی

پتہ مین سنگریزہ پڑنے کو بلیری کیل کیولائی یا گال اسٹون کہتے ہین - شاذونادر جب صفرا کنکری کی مانند منجمد ہوکر پتہ سے بذریعہ پتہ کی نالی کے امعا مین آتا ہے اگر وہ چہوٹے سنگریزون کی برابر ہے تو باسانی گذر جاتا ہے ورنہ اثنا راہ مین پہنسکر تشنج ہونیسے شدید درد اپیگاسٹر ک ریجن مین ہوتا ہے جسکو دبانے سے آرام ملتا ہے اور اسکے ساتھ قے و غشیان و ہچکیان ہوتی ہین - پیشاب سرخ اور پاخانہ مٹی کے رنگ کا آتا ہے - یرقان ہوجاتا ہے - اگر سوزش ہوجاوے تو بخار کی علامات بہی ہوتی ہین اور جب پتہ سے مذکور آنتون مین آجائین تو درد وغیرہ جاتا رہتا ہے اور پاخانہ مین وے ریزے دکہائی دیتے ہین +

علاج

ڈاکٹر اسکیف صاحب *Dr. M. Schuff* فرماتے ہین

[illegible] سوڈا ساڑھے سات گرین مقدار مین دن مین دو بار اسوقت دین جب تک ہضم و دوران خون مین فتور واقع ہو مگر صرف اس علامت سے حرکت یا گہبراہٹ [illegible] دو [illegible] نبض بیقاعدہ اور آرام کیوقت نہایت آہستہ چلے تو دوا مذکور کو بند نکرین بلکہ اسکی مقدار کم کردین کیونکہ ایک عرصہ تک استعمال کئے بغیر فایدہ نہین ہوتا +

ڈاکٹر کولنی صاحب *Dr. J. K. Oeloelony*

تینتیس مریضون کا علاج کرنے سے یہ تجربہ حاصل ہوا کہ اس مرض کے علاج مین [illegible]

لحاظ کرنا ضرور ہوتا ہے اوّل یہ کہ نوبت کی شدت درد کو رفع کریں چنانچہ اسواسطے علاوہ
نیچہ مارفیا کی پچکاری دینا مفید ہے اور اس مرض کے ساتھ قولنج کی علامت ہوں تو افیون
ایسے مرکبات کا دینا مناسب نہیں بلکہ درد کی شدت ہو اور مارفیا سے فایدہ نہو تو کلوروفارم
تیمر سنگھائیں۔ بعض دفعہ بہت دیر تک گرم پانی میں بٹھانے یا گرم پانی میں چادر
بھگو کر کمر پر باندھنے سے بھی فایدہ ہوتا ہے اگر تدابیر مذکورہ کارگر نہوں تو جسطرف درد ہو
وہاں جونکیں لگانا مناسب ہے۔ مسکن ادویات بہت کم دیتے ہیں ؞

دوم بار دیگر پتھری نہ آنے کے لیے ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ ریتہ میں جو سنگریزے ہوں
وہ حل ہو جائیں اور آیندہ کو نہ بنیں چنانچہ یہ بات اسطرح حاصل ہو سکتی ہے کہ زیادہ
غذا لحمدار اور امیرانہ غذا اور روغن و شیرینی و جو کی شراب وغیرہ سے پرہیز کرائیں
اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد دن میں تین چار بار کرکے کھانا کھلائیں ایکبار بہت سا نہیں
بقول ڈاکٹر لیکلر صاحب کے یہ نسخہ پتھری نہ بننے کے لیے بہتر ہے ؞

Rx

نسخہ

[illegible] — ہیڈرسکینیٹ آف ایرادکسایڈ آف ارن ڈیڑھ اونس
Distilled water 3 iv oz. — ڈسٹلڈ واٹر ساڑھے چار اونس
A teaspoonful after each meal. — ان میں سے ایک ایک چاء کا چمچہ بھر کر ہر کھانے کے بعد دیں ؞

Dr. L. Rogers.

ڈاکٹر راجرس صاحب
کہتے ہیں کہ اس مرض میں نسخہ مندرجہ ذیل نہایت مفید ہے ؞

نسخہ

℞.

Bromm. muriatis — آدہا اونس — بیورِیٹ آف امونیا

Ext. liquorice, āā ℥ ss. — آدہا اونس āā — اکسٹراکٹ آف ٹرکیرکیم [illegible]

Aquae, f. ℥ vi. — چہ اونس — واٹر

M.

a dessertspoon- — سبکو ملا کر ایک ڈسرٹ اسپون فل یعنی

ful three times a day. — تین دفعہ دین ✣

Dr. J. E. Jackson. — ڈاکٹر جیکسن صاحب

فرماتے ہیں کہ گوشت اور دیگر اشیاء سے پرہیز رکہنا صرف دودہ و باقی اغذیہ پر

اور یہ نسخہ دینا جو پتہری کے حل کرنے کیلئے نہایت مفید ہو ✣

نسخہ

℞.

Chloroformi, — آدہا اونس — کلوروفارم

Etheris sulphur. āā f. ℥ ss. — آدہا اونس āā — سلفیورک ایتہر

Oleo terebinth. f. ℥ i. — ایک اونس — آئیل آف ٹر[illegible]

Sacchari albi ℥ ii. — ۲ ڈرام — [illegible]شکر

Mucilag. acaciae f. ℥ ii. — ۲ اونس — میوسلیج آف گم اکیشیا

A tea- M. — سبکو ملا کر ایک ایک ٹی اسپون فل یعنی تین

spoonful three times a day — مرتبہ دین ✣

Dr. Durand. — ڈاکٹر ڈیورنڈ صاحب

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید جانتے ہین ✣

نسخہ

Olei terebinth. ʒ iii. ۳ ڈرام — [تیل] آف ٹرپنٹائین

Aetheris sulphur. ʒ i. ۱ ڈرام — سلفیورک ایتھر

Half a table-spoonful night & morning. M. — [ان] دونکو ملاکر آدھا آدھا ٹی اسپون فل

صبح شام دین ؞

ڈاکٹر گارڈنر صاحب

[فرما]تے ہین کہ بیماری کیوقت پوری مقدار مین یا حسب ضرور لاڈنم سوڈا واٹر کے ساتھ
[ملا]کر پلانا - گرم پانی مین بٹھانا - اگر غثیان کی زیادتی ہو تو لاڈنم کا حقنہ کرنا -
[تس]کین درد کے لیے ایتھر یا کلوروفارم کا سنگھانا - ایتھر کا دینا مفید ہے بعض وقت
[تار]پین برن معدہ پر لگانے سے آرام ہوجاتا ہے اگر درد قایم رہے تو جونک وغیرہ کی ضرورت
[ہو]تی ہے ؞

ڈاکٹر میاں [illegible] علی صاحب

[فر]ماتے ہین کہ بیماری کیوقت درد رفع کرنیکو گرم پانی مین غسل کرانا [illegible] گرم سے پیٹ کو
[س]ینکنا یا گرم پولٹس باندھنا یا [illegible] کا ضماد شکم پر کرنا - اور [illegible] مناسب ہے
[illegible]

نسخہ

Liq. opii sedat. m. xx. ۲۰ قطرے — لیکر اوپیای سڈیٹاوس

Chloroformi m xx. ۲۰ قطرے — کلوروفارم

Aquae q. s. حسب ضرور — پانی

M. This every two hrs. — ایک خوراک ہے ایسی دو دو گھنٹہ بعد دینی ؞

اگر دوا مذکورہ قے کی راستہ سے نکل جائے تو افیون کا حقنہ کریں اور کلوروفارم سنگھائیں
ان دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا ضرور ہوتا ہے کہ اس سمیت سے [illegible]
کبھی کاربونیٹ آف سوڈا آب گرم میں ملا کرتے ہیں اور کبھی [illegible] رد کرنے کے لئے برو[illegible]
استعمال کرتے ہیں ٭
جو سنگریزے امعا میں آتے ہیں وہ مسہل کے استعمال سے نکل جاتے ہیں اور جو پتہ میں اٹک کر
نہ پڑنے کے لئے کیسٹر آئل [illegible] ڈسٹلڈ [illegible] دکا لوشنتہ پچکا دینا اور غذا کا پرہیز
کرانا مناسب ہے ٭

Pyrosis.

پائیروسِس

ض اکثر ایسا ہے جب بدہضمی ہوتی ہے اُنہیں ہے صبح یا تیسرے پہر جب معدہ غذا سے خالی ہوتا ہے
ہ میں پانی بھر آتا ہے معدہ میں درد ہوتا ہے۔ جو غش یا بیکی کم و بیش قے ہو جاتی ہے
ہے درد بالکل رفع ہو جاتا ہے۔

علاج

ڈاکٹر نیفیز صاحب Dr. G. H. Napheys کی رائے ہے کہ
یہ مرض اکثر معدہ کے کارگیک امراض ہو لیا ہوتا ہے اور بعض غذیہ مثلاً ادویل یا پنیر یا
تمباکو کے استعمال سے ہو جاتا ہے پس سبب کو دور کرنا اور بسبتہ ہمراہ کا نئو کے دینا
یہ علاج ہے۔

ڈاکٹر پائوری صاحب Prof. Piorry, Paris
نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید جانتے ہیں۔

نسخہ

℞

Sodii bicarbon. ʒiss ڈیڑھ ڈرام
Aquae destill., ایک اونس
Syr. aurantii florum, āā f. ʒi. ایک ڈرام
Olei anisi, gtt. j. M. ایک قطرہ
For one dose.

کاربونیٹ آف سوڈا
ڈسٹلڈ واٹر
سیرپ آف اورنج فلوور
آئل آف انیسی
ملا کر ایک بار دیں۔

نوع دیگر

℞

Quinine sulph. gr. xii. ۱۲ گرین سلفیٹ آف کوئنین

Pepsinae, ℈ v ss. ساڑھے پانچ اسکروپل پیپسین

Ext. absinthii, q.s. حسب ضرورت اکسٹراکٹ ابسنتھی

Divide into forty pills. Two before each meal. M.

سبکو ملا کر چالیس گولیاں بنائیں اور دو دو گولیاں صبح شام کھانا کھانے سے پہلے پائیروسس دفع درد معدہ میں دیں۔

نسخہ

℞

Sodii bicarb. gr. xiv. ۱۴ گرین بائی کاربونیٹ آف سوڈا

Tinct. Columbia f ʒ i. ایک ڈرام ٹنکچر کلمبا

Aquae destill. f ℥ iii. ۳ اونس ڈسٹلڈ واٹر

Infus. gentianae, f ʒ i. ایک ڈرام انفیوژن جنشین

To be taken as above. صبح شام کھانا کھانے سے پہلے دیں۔

نسخہ

℞

Magnesia, gr. i ss. ڈیڑھ گرین میگنیشیا

Bismuth. subnitrat. gr. iv–vii. چار سے سات گرین سب نائٹریٹ آف بسمتھ

Opii pulv. gr. ss. نصف گرین اوپیم پوڈر

M. For one dose. یہ ایک خوراک ہے کھانا کھانے سے پہلے دیا کریں۔

...اکٹر میر اشرف علی صاحب

...شوں مین کہ ترش تے وغیرہ ہو جکی حالت مین یہ نسخہ مفید ہوگا

نسخہ

...مس ڈائیکر بیٹے آف بسمتھ	۱۰۰ گرین
...یوڈ ہیڈرو سیانک ایسڈ	۳ منم
...یوشن آف پٹاش	۴۰ منم
...لیج آف گم	نصف اونس
	نصف اونس

...لو ملا مین یہ ایک مقدار ہوا ایسی تین
...روز مین تین بار دین ۔

Paralysis
پرالیسس

پرالیسس کو انگریزی مین پالسی عربی مین استرخا یا فالج اور بیدک مین بات
کہتے ہین اس مرض مین جسم کے کسی حصہ کی حرکت کی طاقت اور کبھی حس کی طاقت بھی زا
ہو جاتی ہے چنانچہ دونون طاقت جاتی رہین تو اسے پرفیکٹ یعنی کامل اور صرف ایک
طاقت زایل ہو تو اسے امپرفکٹ یعنی ناکامل فالج بولتے ہین ۔

دماغ یا حرام مغز مین بیماری ہونے یا کوئی سمیت مثلاً مواد آتشک یا سیسہ یا پارہ
جسم مین اثر کرنے یا کسی جگہہ کے خراش جیسے پیٹ مین کیڑے پڑنے یا سردی لگنے
بعض خراب غذا جیسے کسارے دال کے کھانے سے اقسام مذکورہ ذیل مین سے کسی
کا فالج ہو جاتا ہے ۔

بڑی قسم فالج کی دو ہین ایک جنرل پرالیسس یعنی عام جسمین کل جسم کی حس حرکت ز
ہو جاتی ہے دوسرے پارشیل پرالیسس یعنی خاص عضو کا فالج ہونا جسکی بہت
قسمین ہین جیسا فشیل پرالیسس یعنی لقوہ ۔ امیوروسس یعنی آنکھ کے پر
دیکھنا کا فالج ۔ ٹوسس یعنی آنکھ کے بالائی پپوٹہ کا فالج ۔ ہمی پلیجیا یعنی نصف
جسم کا طول کی جانب کا فالج ۔ پاراپلیجیا یعنی نصف جسم کا عرض کی جانب فالج
کبھی تو مقام کے لحاظ سے فالج نام رکھتے ہین جیسا کہ ذکر ہوا اور کبھی اور طرح سے
مثلاً کسی جگہہ کے خراش جیسا کرم امعا کے سبب اکثر لڑکونکا پاؤن رہجاتا ہے تو اسے ر
پرالیسس ۔ اور جسم کے دو طرف دو جگہہ یعنی ایک طرف کا ہاتھ فالج ہو تو دوسری طرف
پاؤن اسے کراس پرالیسس ۔ اور فالج کے ساتھ عضو بھی لاغر ہو جاوے تو اٹروفک پالسی کہ

کسی سبب سے جو فالج ہوتا ہے اسمین سے دو بہت مشہور ہین ایک تو سیسہ کے اثر سے جو ہوتا
وہ لیڈ پالسی دوسرا پارہ کے سبب سے جو ہوتا ہے وہ مرکیوریل پالسی کہلاتا ہے ٭
ایک قسم کا فالج اور ہے جسے پرالیسس اجیٹنس یعنی رعشہ کہتے ہین جو اکثر شراب پینے
یا نشہ ہنکو یا جسمانی و روحانی محنت کی کثرت سے ہوتا ہے ٭
پارشیل پرالیسس کی جو ایک قسم ہیمی پلیجیا ہے اسکی بہی چند قسمین ہوتی ہین جو ابہی بیان
کی گئی ہین یعنی مرگی کے سبب سے ہو تو اپیلیپٹک ہیمی پلیجیا۔ کوریا سے ہو تو کوریک ہیمی پلیجیا
دماغی عارضہ کی وجہ سے ہو تو سریبرل ہیمی پلیجیا۔ حرام مغز کی خرابی سے ہو تو
سپائنل ہیمی پلیجیا کہتے ہین ٭

علاج

ڈاکٹر ہیڈلینڈ صاحب Dr. F. W. Hadland فرماتے ہین کہ
اس مرض مین اسٹرکنیا سے بہتر کوئی دوا نہین ہے لیکن یہہ دوا اسیوقت مفید ہوتی ہے
جب نروس سنٹر کا صدمہ دور رفع ہو گیا ہو صرف مدت تک حرکتی اعصاب کا فعل بند ہونے
سے عضو مفلوج ہی ہو اور اگر نروس سنٹر کا صدمہ موجود ہو یا ایسا شدید ہو کہ جبتک
ان تک [illegible] ہو سکے تو ایسی دوا سے کچھہ فایدہ نہین ہوتا ٭

ڈاکٹر واٹسن صاحب Sir. T. Watson.

فرماتے ہین کہ اسٹرکنیا اسحالت مین مفید ہوتا ہے کہ جب سپائنل کارڈ مبتلا مرض ہو ٭

ڈاکٹر ہیمنڈ صاحب Prof. W. A. Hammond

فرماتے ہین کہ پارشیل پرالیسس مین ایک گرین ایک ڈرام والا سولیوشن آف اسٹرکنیا [illegible]

اسطرح دینا مفید ہے کہ پہلے دن دس دس قطرے دوسرے دن گیارہ گیارہ ۔ تیسرے دن بارہ بارہ وعلی ہذا القیاس ایک ایک قطرہ زیادہ کرتے جائیں جب ٹانگوں اور جبڑے کے عضلات میں سختی اور تناؤ سا معلوم ہونے لگے بند کردیں اور ضرورت ہو تو پھر دس دس قطرے سے شروع کرکے بڑھائیں اور جس وقت نمودار ہونے علامات مذکورہ بالا کے بند کردیں ۔ عموماً تناؤ و سختی وغیرہ سب جگہ سے پہلے پنڈلیوں میں معلوم ہوتی ہے ۔

علاج مذکورہ بالا کے ساتھ ورزش کرانا اور بجلی بھی لگانا چاہیے ۔ آج کل قریب قریب کل اقسام فالج میں الکٹرسٹی لگانا بہت مفید جانتے ہیں ۔

Purpura Haemorrhagica.

پرپیورا ہموراجیکا

اگرچہ سبب اس بیماری کا ابھی معلوم نہیں ہوا ہے مگر محنت و مشقت کی زیادتی و مرطوب یا خراب آب و ہوا میں رہنے بدن کو غلیظ و کثیف رکھنے ایک ہی قسم کی خراب کم غذا کھانے سے اعضا شکنی و ضعف و درد کمر و درد معدہ ہو۔ بڑے بڑے چکتے یا خونی داغ جسم پر پڑ جائیں۔ ناک و مسوڑوں سے خون جاری ہو۔ پنڈلیوں کا گوشت خون بھرنے کے سبب سخت ہو جائے۔ نبض متواتر چلنے لگے تو اس مرض کا نام انگریزی میں پرپیورا ہموراجیکا اور عربی میں احتراق سوداء کہا جاتا ہے۔

علاج

ڈاکٹر ٹینر صاحب Dr. T. H. Tanner فرماتے ہیں کہ سلفیٹ آف سوڈا مع سلفیورک ایسڈ یا کیسٹر آئیل سے امعاء کو صاف کرنے کے بعد یہ نسخہ دینا چاہیے۔

نسخہ

℞.

Quinine sulph. gr. 12 — ۱۲ گرین — کونین

Acidi phosph. dilut. ʒiss — ڈیڑھ ڈرام — ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ

Tinct. ferri chloridi ʒiss — ڈیڑھ ڈرام — ٹنکچر آف کلورائڈ آف آئرن

aa f. ʒiss.

Liq. arsenici hydrochloric. m xx–xl — پندرہ منم سے چالیس منم

Syr. zingiberis f. ʒvi — ۶ ڈرام — سیرپ آف جنجر

الیفورن آمنہ کو شبا انا کر انہ اونس ہو جائے پھر — Perfusorum grains
adj. 3 viii.
اسکو مقدار ایک چھٹا حصہ ہر کھانیکے بعد دین — the sixth part
تین بار پلا دیوے ۔ — directly after breakfast.

نسخہ مذکورہ بالا کے ساتھ غذا ئیت بخش غذا و تازہ میوہ ترکاری و شراب بھی دینا
اور کسی اندرونی عضو سے اجزا خون ہو تو ایل ف ترپین تائمنٹ یا گیلک ایسڈ یا ایریجیلو
سلفیورک ایسڈ دیئے ہیں ۔

ڈاکٹر ڈیوس صاحب — Prof. N. S. Davis

فرماتے ہیں کہ کہیں سے خون نکلتا ہو تو وہاں پر سلفیٹ آف آئرن لگائیں مریض کو آرام
رکھیں ۔ ٹنچر پرکلسی ورا گٹ بار بار دیں جب خون بند ہو جائے تو کم مقدار میں
مذکور کو دینی تین تا تین بار تین ماہ تک دیتے رہیں لیکن درمیان میں دو چار روز بند
بھی کر دیں یہ خیال رکھیں کہ بول و براز صاف ہوتا رہے ۔ مقوی ادویہ و غذیہ
کی جلدی شروع کریں ۔

ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب

فرماتے ہیں کہ مقوی و حارہ دوائیں دینا ۔ عمدہ غذا و گوشت کھلانا ۔ ایک گلاس صبح عرق
خمیرہ تین چار بار پلانا ۔ مریض کو اچھی جگہ آرام سے رکھنا ۔ مرکبات فولاد و کونین
استعمال کرنا ۔ کسی اندرونی عضو سے اجزا خون ہو تو قلیل المقدار ... گیلک
ایسڈ یا سلفیورک ایسڈ دینا اس مرض کا بہتر علاج ہے ۔

Progressive locomotor ataxia
پروگریسیو لوکوموٹر اٹکسی

اس مرض میں ٹانگوں کے عضلات کی طاقت موجود ہوتی ہے اور حس و حرکت میں کچھ فرق نہیں آتا مگر ان عضلات پر مریض کا اختیار نہیں رہتا اس سبب سے وہ چلتے وقت لڑکھڑاتا اور دائیں بائیں گرنے کے خوف سے سہارا ڈھونڈتا ہے اور چل پڑتا ہے تو بے اختیار ہو جاتا ہے رک نہیں سکتا اور کوسوں چلا جاتا ہے لیکن جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو وہ قدم بھی نہیں چل سکتا ۔

مرض کے ظاہر ہونے سے پہلے چند ماہ کے واسطے جا بجا درد ہوتا رہتا ہے اور شب کو بستر پر مریض کا پیشاب نکل جاتا ہے مباشرت کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ جسم کے مختلف مقام مثلاً ہاتھ یا پاؤں ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ کسی نے کس دیے ہیں۔ مرض کے ظاہر ہونے سے پہلے اکثر مریض کو جریان منی کا عارضہ ہوتا ہے ۔

علاج

ڈاکٹر ہملٹن صاحب A. M. Hamilton M. D. لکھتے ہیں کہ اس مرض کا بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ابتدائے مرض میں مندرجہ ذیل نسخے دیں

نسخہ

Rx.

لکوئڈ اکسٹراکٹ آف ارگٹ	۲ اونس	Fl. Ext: ergotae, f. ℥ii
برومائڈ آف سوڈیم	ڈیڑھ اونس	Sodii bromide f. ℥iss

کیمفر واٹر اتنا ملائیں کہ چار اونس ہو جاوے — Aquae camph. ad ℥iv.
سب کو ملا کر ایک ایک ٹی اسپون مثل چار
چار گھنٹہ بعد دیں ۔

نائٹریٹ آف سلور کو اس مرض میں بہت کچھ مفید جانتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں

نسخہ

Rx.

Argent. nitratis gr. vi–viii,	نائٹریٹ آف سلور چھ گرین سے آٹھ گرین
Ext. nucis vomicae, gr. xii.	اکسٹرکٹ آف نکس وامیکا ۱۲ گرین
Make 24 pills,	دونوں کو ملا کر چوبیس گولیاں بنائیں
one after each meal.	اور ایک ایک گولی ہر کھانے کے بعد دیں ۔

نوع دیگر

Rx.

Argento nitratis,	نائٹریٹ آف سلور چھ گرین سے آٹھ گرین
Ext. belladonnae, gr. vi–viii	اکسٹرکٹ آف بلاڈونا چھ سے آٹھ گرین
Ext. gentianae, q.s.	اکسٹرکٹ آف جنشین حسب ضرورت
Make 24 pills — one	سب کو ملا کر چوبیس گولیاں بنائیں اور ایک
after each meal	ایک گولی ہر کھانے کے بعد دیں ۔

ہر شب سالٹ فٹ باتھ کرنا بھی مفید ہے اور سلفر باتھ سے بھی اکثر پرانے مریضوں کو فائدہ ہوا ہے جس کا یہ طریقہ ہے کہ پانی میں تھوڑا سا سلفائیڈ آف پوٹاسیم ملا کر اس سے غسل کرائیں ۔

اکثر ٹرا سو جتا Prof. Trousseau, Paris

...کے سبب ہو تو مرکبات پارہ و آیوڈائیڈ آف پٹاسیم کا دینا مفید ہو اور الکحل...

...سے بھی اس مرض مین فایدہ ہوتا ہے ✦

ز

Pleurisy
پلورسی

پلورا یعنی حجاب الریہ کی سوزش کو انگریزی میں پلورسی یا پلورائیٹس اور عربی میں ذات الجنب کہتے ہیں۔ اسکے دو درجے کئے گئے ہیں ایک شدید دوسرا مزمن ٭ سردی یا سینہ کی چوٹ کے سبب حرارت سے بخار ہوکر جسطرف مرض ہو ادھر کی جانب سینہ میں ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ کھانسنے و کروٹ بدلنے و سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے بلکہ مریض بدقت تمام پیٹ سے سانس لیتا ہے۔ اور کبھی بالکل درد نہیں یا خفیف ہوتا ہے یا نبض متواتر و سخت کھنچی ہوئی و زبان میلی و پیشاب سرخ و کم اور خشک و جلد گرم ہوتی ہے۔ جدہر مرض ہو ادہر لیٹا نہیں جاتا ٭

بعد کچھ عرصہ کے یہ مرض مزمن ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ بلا سوزش حاد ابتدا سے ہی مزمن کی سی علامات ہوتی ہیں یعنی نبض پر تیزی۔ تنفس میں دقت۔ لاغری جسم جانب مرض لیٹے رہنا وغیرہ ٭

علاج

J. S. Bristowe, M.D. ڈاکٹر برسٹو صاحب

جب مرض خفیف ہو تو سینہ پر رائی کا پلاسٹر لگانا ایک چوڑی پٹی فلالین کی سینہ پر باندھنا اور مرکبات افیون کا دینا کافی ہوتا ہے مگر جب بخار ہو اور افیوژن ہونے لگے تو چھ بارہ جونک سینہ پر لگاکر پولٹس باندھنا یا سینک کر اور افیون کے مرکبات و دیگر دوا دینا مناسب ہے۔ اگر اس تدبیر سے رطوبت کا رسنا بند ہو تو مقوی ادویات جسم

مرکبات فولاد و کونین دینا اور چھوٹے چھوٹے بلسٹر سینہ پر لگانا بہتر ہے اور اسہالات
مین مدرات و مسہلات و مرکبات پارہ و ڈیجی ٹیلس آیوڈائیڈ آف پٹاسیم جو دیتے ہین ان
سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے؁

ڈاکٹر لومس صاحب A. L. Loomis. M. D.

فرماتے ہین کہ آرام سے رکھین اینڈ آئین پولٹس لگائین - کمزوری ہو تو سیرپ آف
آیوڈائیڈ آف آئرن بقدر ایک ڈرام دن مین تین چار بار دین کیونکہ مرکبات فولاد سے
رطوبت جذب ہوتی ہے اور ابتدا مرض سے دوسرے تیسرے ہفتہ تک مسہلات نہ دین مگر
مرض سب اکیوٹ قسم کا ہو تو محرکادویہ و غذائیت بخش غذیہ کا دینا مناسب ہے؁

ڈاکٹر کاسٹا صاحب Prof. J. M. Da Costa

فرماتے ہین کہ سب اکیوٹ پلوریسی مین یہ نسخہ مفید ہے؁

نسخہ

℞.

Potass. acetatis, gr. xv	۱۵ گرین	ایسیٹیٹ آف پٹاش
Spts. aetheris nitrosi, f. ʒss.	نصف ڈرام	اسپرٹ نائٹر
Vini ipecacuanhae, gtts. iii	۳ قطرے	وائن آف اپیکاکوانا
Syr. tolutani, f. ʒss.	نصف ڈرام	سیرپ آف ٹولو

For one dose. - four times a day.

یہ ایک خوراک ہے ایسی دن مین چار دفعہ دین؁

مزمن ذات الجنب مین یعنی جب رطوبت خارج نہ ہوئی ہو نسخہ مندرجہ ذیل دینا دن مین
تین بار اور ٹرنچر آیوڈین کا ٹیوپ کرنا مفید ہے؁

℞ نسخہ

Tinct. veratri viridis, m xxiv. — ٹنکچر آف گرین ہیلے بور ۲۴ قطرے

Potassi acetatis, ℥ss. — ایسیٹیٹ آف پوٹاش نصف اونس

Morphiae acetatis, gr. ss. — ایسیٹیٹ آف مارفیا نصف گرین

Liq. potassi citratis, f.℥iss. — سولیوشن آف سائٹریٹ آف پوٹاش ڈیڑھ اونس

Syr. tolutani, f.℥ss. — سیرپ آف ٹولو نصف اونس

M. A dessert-spoonful every three hours. — سب ملا کر ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

جب اخراج رطوبت ہونے لگے تو یہ نسخہ دینا چاہئے۔

℞ نسخہ

Potassi acetatis ʒj. — ایسیٹیٹ آف پوٹاس ایک اونس

Tinct. digitalis — ٹنکچر آف ڈیجیٹیلس ۲ ڈرام

Ext. Cinchon. fl. f.℥j. — لکوئیڈ اکسٹرکٹ آف سنکونا ایک اونس

پانی ۸ اونس

سب ملا کر ایک ایک بڑا اسپون دن میں تین مرتبہ دیں۔

مرض ذات الجنب میں عمدہ غذا کھلانا اور ٹنکچر آف آیوڈین لگانا اور یہ نسخہ دینا مناسب ہے۔

Rx. نسخہ

Potassii Iodidi ʒ ii. — ۲ ڈرام — آیوڈائیڈ آف پٹاسیم

Tinct. Scillæ f ʒ vi. — ۶ ڈرام — ٹنکچر آف سکوئلز

Tinct. Opii Camph. f ℥ i ss. — ڈیڑھ اونس — ٹنکچر اوپیائی کمفر

Mistura ... f ℥ vi. — ۶ ڈرام — گم مکسچر

A teaspoonful four times a day.

سب کو ملا کر ایک ٹی اسپون فل دینا چار دفعہ دن ۔

ڈاکٹر کنکیٹو صاحب Prof. Concato فرماتے ہیں کہ اگر بخار نہ ہو اور رطوبت کو خارج ہوئے بہت عرصہ نہ گذرا ہو تو قوت بخش غذا دینا اور بجائے نشگاف دیگر رطوبت خارج کرنے کے سینہ کو اس ترکیب سے دبانا مفید ہوتا ہے کہ جانب صحت دونوں ہاتھوں سے پانچ منٹ سے پندرہ منٹ تک دباویں اور دن میں دو بار یہ عمل کریں جس سے رطوبت جلد جذب ہو جاتی ہے اور تنفس کی دقت جاتی رہتی ہے ۔

ڈاکٹر جانسٹن صاحب Dr. Johnston. فرماتے ہیں کہ شدید ذات الجنب میں اگر آدمی قوی ہو تو بذریعہ فصد آٹھ اونس ✢ خون نکالیں ۔ ورنہ جونک یا سینگی سینہ پر لگائیں اور یہ مسہل دیں ۔

Rx نسخہ

Calomel gr. x. — ۱۰ گرین — کیلومل

Pulv. Jalap. — ۲۰ گرین — جلاپ پوڈر

✢ اس زمانہ میں اکثر ہندوستانیوں کی فصد اس مرض میں لینا مناسب نہیں سمجھا جاتا ۔

تو دوانکو ملاکر ایکدم سے پانی کے ہمراہ پھنکا دین ۔

اسکے بعد پانچ گرین کیلومل اور دو گرین افیون کی ایک گولی دیکر دو دو گرین کیلومل
اور نصف نصف گرین افیون ملاکر دو دو گھنٹہ بعد دیتے رہین اور جب مسوڑے درد
کرنے لگین بند کردین ۔

اگر اسکے ساتھ ذات الریہ بھی شامل ہو تو دوا مذکور کی ہر خوراک مین دو دو گرین اپیکاکو
بھی ملادین ۔

جب کچہ آرام ہونے لگے اور ابتدا مرض مین کان لگاکر سننے سے جو گڑگڑ کی آواز آتی ہے وہ
کم ہو جائے تو خاص مقام درد کے نیچے آبلہ انگیز دوا لگائین اور یہ نسخہ دین ۔

نسخہ

ایسٹیٹ آف پٹاش	۵ گرین
ٹنکچر آف گرین ہیلے بور	۲ قطرے
ا[illegible]	نصف گرین
[illegible] پوڈر	ایک گرین

یہ ایک خوراک ہے ایسی دن مین دو تین بار
دین ۔

جون جون مریض کو آرام ہوتا جائے نسخہ مذکورہ بالا بند کرکے صرف چار گرین آیوڈائیڈ آف
پٹاسیم یا شورہ چرائتہ کے خیساندہ کے ساتھ ملاکر دن مین تین بار پلانا شروع کردین ۔

Phthisis Pulmonalis

تھائی سس پلمونیلس

اسکو انگریزی مین کنزمشن اور طبابت مین سل اور بیدک مین چھیٹی روگ کہتے ہین
اس مرض مین سفید زردی مایل خراب قسم کی رطوبت جو ٹیوبرکل کہلاتی ہے ابتداءً
اکثر داہنے پھیپھڑے کے بالائی لوتھڑے مین جمع ہوتی ہے جسکے سبب پھیپھڑہ گلتا جاتا
ہے اور رفتہ رفتہ غار پڑجاتے ہین اور اسیطرح دونون پھیپھڑے خراب ہوجاتے ہین
اور دیگر اندرونی اعضا مثلاً حنجرہ و قصبۃ الریہ و امعاد وغیرہ مین بھی زخم ہوجاتے ہین
یہ خطرناک مرض دو صورتون مین ظاہر ہوتا ہے ایک تو شدید دوسرے مزمن اور دونون
کے علاج مین بہت فرق ہے یعنی شدید مین فوراً تیز دواؤن کے دینے سے آرام ہوتا
ہے اور مزمن مین دوا سے کم فایدہ کی امید کیجاتی ہے بلکہ اسمین آرام ہونا غذا و حفظ صحت
کے عمدہ بندوبست پر منحصر ہے - اسلئے دونون کا جدا جدا بیان کیا جاتا ہے ۞

Acute Phthisis.
اکیوٹ تھائسس

اسکو اکیوٹ ملیری ٹیوبرکیولوسس اور گیلوپنگ کنزمشن اور اکیوٹ پلمونری کنزمشن بھی کہتے ہیں اسمیں تمام پھیپھڑے کی ساخت کے اندر بہت جلد مادہ ٹیوبرکل جمع ہو جاتا ہے سوا اسکے اور کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی کہ بخار ایسا تیز ہوتا ہے کہ جسمی حرارت ایکسو چار درجہ پیمانہ حرارت پر اور تنفس چالیس سے ساٹھ تک اور نبض ایکسو ستر سے ایک سو اسی تک ایک منٹ میں ہوتی ہے - روزمرہ جاڑا چڑھتا ہے - شکم پر دبانے سے درد خشکی لب و زبان درد سر بیخوابی بے چینی ہذیان دقت تنفس ہو کر قلیل عرصہ تخمیناً دو سے بارہ ہفتہ کے اندر مریض مر جاتا ہے ۔

علاج

Dr. McCall Anderson ڈاکٹر اینڈرسن صاحب

فرماتے ہیں کہ [illegible] مریض کو [illegible] اگر [illegible] بعد عمدہ و مقوی غذا دے اور چار یا چھ اونس برانڈی روزمرہ پلانے سے آرام ہوا ہے ۔
رات کا پسینہ دور کرنے کیلئے سوا [illegible] حصہ گرین اٹروپیا کی پچکاری زیر جلد رات کو کرنا ۔
نسخہ مندرجہ ذیل ایک عمدہ محرک و دافع بلغم ہے ۔

نسخہ

℞.

Ammon. Chlorid. ʒi	ایک ڈرام	کلورائیڈ آف امونیم
Syr. Scillae f. ʒiii	۳ ڈرام	سیرپ آف اسکوئیل

Infus. senegæ, f. ℥ vi. m. — نفیوزن آف سینگا چھ اونس
A tablespoon- — سبکو ملاکر ایک ایک ٹیبل اسپون فل تین
ful three times a day. — بار روزانہ دین

اگر بخار کی علامات کم نہون تو نسخہ ذیل بہت فایدہ ہوتا ہی

℞ نسخہ

Quinine sulph., — سلفیٹ آف کونین ۱۲ گرین
Pulv. digitalis, āā gr xii. — ڈیجیٹالیس پوڈر ۱۲ گرین
Pulv. opii, gr vi. — اوپیم پوڈر ۶ گرین
Make 12 pulv., m. one — سبکو ملاکر بارہ پوڑیان بنائین اور چار چار
every 4 or 6 hrs — یا چھ چھ گھنٹہ بعد ایک ایک پوڑیہ دین

اس مرض مین شکم پر جو حرارت زیادہ معلوم ہوتی ہے وہ اس ترکیب سے نصف گھنٹہ مین دفع
ہو جاتی ہے کہ مریض کے نیچے دوہرا کمبل بچھا دین اور فلالین کے دو ٹکڑے اتنے بڑے
لین کہ سارے پیٹ پر آجائین پھر ایک ٹکڑے کو ٹھنڈے پانی مین بھگو کر نچوڑ کر پیٹ پر رکھین
اور دوسرے کو پانی مذکور مین بھگنے دین بعد ایک یا دو منٹ کے اسے بدل کر دوسرا
رکھ دین اور اسی طرح کرتے رہین اگر کلاپس ہو جاے یا زیادہ سردی لگے تو بند کر دین

Chronic Phthysis

کرانک ٹہتھارسس

کرانک ٹہتھارسس یا کرانک کنزمشن عرصہ سل کو کہتے ہیں اگر خاندان میں یہ مرض
یا کسی کا مزاج اسکرافیولس ہو یا خراب غذا و خراب آب و ہوا وغیرہ کے سبب سے ضعف ہو
تو اکثر یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں ایسی خفیف علامات ہوتی ہیں کہ جن سے سل کا گما
بھی نہیں ہوتا مثلاً کچھ روز تک خشک کھانسی اکثر صبح کو اٹھتی ہے تنفس میں دقت
لاغری ہوتی جاتی ہے۔ بدہضمی و کمی اشتہا اور مزاج میں سستی رہتی ہے
مگر کچھ عرصہ بعد ذرا سا خون کھنکار میں نکل آتا ہے جس سے مریض کو وہم سا ہوتا ہے
مگر وہ ایسا خفیف ہوتا ہے کہ جلد اسکا خیال جاتا رہتا ہے لیکن مہینوں یا برسوں کے
جب کھانسی تنگی تنفس درد سینہ و کمزوری کی زیادتی ہوتی ہے تب مریض علاج کا
ہوتا ہے۔ بعدہ تپ دق کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ۔ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں ہوکر
رہتی ہے اسہال ہوتا ہے آخر کو ہاتھ پاؤں پر ورم دکھائی دیتا ہے تنفس و حیوانی
اسہال [illegible] ہوکر مریض مر جاتا ہے مگر مرتے دم تک مریض کے ہوش و حواس
بجا رہتے ہیں ۔

خون تھوکنا اس مرض کی ایک مشہور علامت ہے مگر بعض مریضوں کو بالکل خون نہیں
آتا ہے تو اخیر درجہ میں بہت زیادہ نکلتا ہے ۔

علاج

سہولیت بیان کے لئے اس مرض کا علاج دو فقروں میں لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے

فقرہ اوّل مین عام علاج کا ذکر ہوگا اور فقرہ دوم مین خاص علاج کا +

فقرہ اوّل دربیان عام علاج مرض سل

ڈاکٹر فلنٹ صاحب Prof. A. Flint, M. D.

چہیہ سو ستر مریضونکا علاج کرنے سے نتیجہ ذیل حاصل ہوا +

(الف) بہت سے مریضونکو تبدیلی آب ہوا سے فایدہ ہوتا ہے کہ یہ بات آب ہوا کے سبب سے نہین بلکہ انکا ایک سفر کرنیکی وجہہ سے ہوتی ہے +

(ب) گہر مین چپ چاپ بیٹھے رہنے سے باہر نکلنا پہرنا بہتر ہوتا ہے +

(ج) اکثر بحری سفر سے بہی فایدہ ہوتا ہے لیکن یہہ بہی بوجہہ ریاضت کے ہے کچہہ دریا کے اثر سے نہین +

(د) ذایقہ و بہوک سے معلوم ہوسکتا ہی کہ کونسی و کتنی غذا مریض ہضم کرسکتا ہے پس اُسیکے مطابق کہلائین +

(ہ) روزمرہ اسفنج سے جسم کو ملنا اور تہوڑی تہوڑی ورزش کرنا بہی مفید ہے +

(و) چوتہائی مریضونکو کاڈلور آئیل سے فایدہ ہوتا ہے اور اسی قدر مریضون کو ہیپوفاسفیٹ سے - اور تہائی مریضونکو الکہل دینے سے کم و بیش مرض رکجاتا ہے +

(ز) بول و براز مین چربی سی معلوم ہو تو پنکریاٹک امَلشن کا دینا مناسب ہے

ڈاکٹر نیمیر صاحب Prof. Von Niemeyer فرماتے ہین کہ

سل کے علاج مین توجہ کے قابل علامت بخار ہے جو باوجود دوا دینے کے بھی نہین
جاتا پس اسکا خیال رکھنا ضرور چاہئے۔ اور گرمی کی زیادتی جو اس مرض مین ہوتی
ہے اسکے روکنے کیواسطے یہ نسخہ مفید ہے؛

نسخہ

Rx.

Pulv. digitalis ۱۰ گرین — ڈیجیٹیلس پوڈر
gr. x.
Pulv. ipecacuanhae ۵ گرین — اپیکاکوانا پوڈر
Pulv. opii, aa gr. v. ۵ گرین — اوپیم پوڈر
Ext. helenii, q.s. — اکسٹرکٹ آف ہالس من الولور حسب ضرورت
M.
Ft. 20 pills. one — سبکو ملا کر بیس گولیان بنائین اور
three times a day — ایک گولی دن مین تین بار دین ؛

اگر باری سے بخار آتا ہو یعنی شام کو سردی لگکر زیادتی اسکی ہوتی ہو تو نسخہ مذکور
بالا مین بیس گرین کونین بھی ملا دین اور جب ضربات نبض و حرارت مین کمی ہو جائے
تو دوا کو [illegible] کر دین اور حرارت و ضربات کی زیادتی ہو تو پھر شروع کر دین اسی
اسی طرح جاری رکھین چنانچہ دوا کے بند کرنے اور جاری کرنے کے موقع کو خود
مریض خوب پہچان سکتا ہے؛

اس مرض مین کاڈ لور آئل کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے لیکن اسکا فایدہ جب ہی ہوتا ہے
جب مناسب حالت پر دیا جائے یعنی جب مریض کا جسم دبلا اور جلد کے نیچے چربی کم
نبض تیز ہو تو ظاہر ہوتا ہے کہ نظام عصبی کا فعل بڑھ گیا ہے ایسی صورت مین کاڈ لور
کے دینے سے جسم مین فربہی اور مرض مین کمی ہو جاتی ہے مگر جب مریض موٹا اور ناک اور

بالائی لب بڑھا ہوا دل سکڑ کے عرض و نظام عصبی کے خراش مین کمی ہو تو معلوم ہوتا ہے
کہ جسمی صرف علیل ہوتا ہو اس حالت مین کاڈلور آئیل کے دیئے سے بھی کچھ فایدہ
نہین ہوتا ٭

ڈاکٹر یو صاحب Dr. L. B. Gee. فرماتے ہین کہ
بعد وسیع تجربے کے یہ معلوم ہوا کہ اس مرض کے علاج مین ان باتون کا خیال
رکھنا چاہیے ٭

اوّل الکلائن ہائپو فاسفائیٹ کا استعمال ۔ جب دونون پھیپھڑے ماؤف ہو
تو ہائپو فاسفائیٹ سے فایدہ نہین ہوتا مگر جو بصورت و بلغمی مزاج والون مین بہ نسبت
سیہ فام و دموی یا صفراوی مزاج والون کے ۔ اور جوانون مین بہ نسبت بڈھون
کے اور بچون کے تمام امراض سریع ہین ۔ اور جوانون کے صرف پھیپھڑے کے بالائی
حصہ پر ہی مرض کا اثر ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے ۔ اور جب اس سے فایدہ ہونے والا
ہوتا ہے تو فوراً ہی آرام معلوم ہونے لگتا ہے یعنی رات کے پسینہ آنے اور کھانسی مین
کمی ہو جاتی ہے مگر کبھی کبھی کھانسی کسی قدر زیادہ بھی ہو جاتی ہے [illegible] اسکا استعمال
سے بالکل آرام ہو جاتا ہے لیکن ذرا سے سبب مثلاً رات کو جاگنے وغیرہ سے یہ حالت
خراب ہو جاتی ہے اور اس حالت مین پھر اس دوا سے کچھ فایدہ نہین ہوتا بدین وجہ
مریضون کو اس دوا سے آرام معلوم ہوتا ہو تو انکو بہت احتیاط سے رکھین ٭

دوم اینٹی سیپٹک انہیلیشن ۔ ڈاکٹر ہیبری صاحب نے اینٹی سیپٹک دواؤن کا
انہیلیشن دیکر اور انکا پانی ملا ہوا سولیوشن لگا کر بہت فایدہ حاصل کیا ہے یعنی
دو تین گھنٹہ بعد کھانسی کم اور چند روز بعد بالکل جاتی رہتی ہے اور بلغم کا آنا کم اور بدبو

کا آنا رفع ہو جاتا ہے ۔

درختوں سے خوشبودار ابخرے مثلاً فرنکن سینس، ٹار و ٹرپنٹائن آئیل وغیرہ کے بخارات لینے کو اس مرض میں فایدہ مند بتاتے ہیں پس مرض کی علامات شروع ہونے سے پہلے بہت سے مریضوں کے سانس سے جو بدبو آتی ہے اسی حالت میں بار بار ابخرہ مذکور لوا دیں اور ایسی کوشش کریں کہ تمام پھیپھڑے کی ساخت میں وہ بخارات پہنچ جائیں چنانچہ ایسے مریض کے کمرے میں بھی ادویات مذکور کی دہونی وغیرہ کریں ۔

سوم پہاڑ کی آب ہوا ۔ اگرچہ پہاڑ کی آب ہوا اکثر مریضوں کے لیے فایدہ مند ہے لیکن جنکو بخار آتا ہو یا کمزور ہوں انکو پہاڑ پر جانا مناسب نہیں ہے ۔

چہارم آرام ۔ بقول ڈاکٹر پوصاحب مریض کے بیٹھا رہنے اور تنفس کم کرنے سے سل والے مریض کو کچھ فایدہ نہیں ہوتا لیکن اسکے ساتھ نمونیا ہو تو بیشک تنفس کا کم کرنا مفید ہے ۔ اور پھیپھڑہ کی طرف کم خون جانے کے خیال سے چلنے پھرنے کو منع کرتے ہیں وہ انکا خیال غلط ہے ۔

Prof. Jaccoud

ڈاکٹر جیکوڈ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مریض کاڈ لور آئیل نہ پی سکے تو دو حصہ تیل میں ایک حصہ برانڈی یا رم ملا کر ناک بند کر کے پلانا مناسب ہے ۔ اور پہلے مقدار اوسکی کم ہو پھر دو ٹیبل سپون فل پھر اور زیادہ حتی کہ دن بھر میں پانچ یا چھ اونس تک دیدیں ۔

آئیرن کے مرکبات کا دینا منظور ہو تو بچوں کو سیرپ آف آئیوڈائیڈ آف آئرن بقدار مقررہ اور بڑی عمر والوں کو آئیوڈائیڈ آف آئرن کی گولیاں چار سے آٹھ تک کھانا کھانے سے پہلے دیا کریں مگر جب سانس پھولا ہو تو یہ دوا نہ دیں ۔

و گندک کی تیزاب کے ڈالیوٹ فاسفورک ایسڈ کا دینا مفید ہی ؛

چہارم دوا بدرجہ سب بلا کر اتنا ہو کہ ایک گھونٹ مین پی لیا جاے اسلیے ابتدا مین تیل ایک
ٹی اسپون تک اور بدرجہ ایک ٹیبل اسپون تک سے زیادہ نہو اور پھر رفتہ رفتہ تیل کی مقدار
ایک ٹیبل اسپون تک کر دین ؛

پنجم - تیل کی مقدار ایک ٹیبل اسپون تک دن مین دو یا تین بار دینا کافی ہے کیونکہ بمقدار
کثیر دینے سے معدہ یا جگر مین فتور ہو نیکے سبب غیر منہضم نکلجاتا ہے ؛

ششم غذا کا بھی لحاظ چاہئیے یعنی جب تیل دین تو تمام روغنی و شیرین اشیا
و حلوا و مکھن و بالائی وغیرہ کم و چربی دار گوشت بالکل ندین بلکہ ایک سادہ غذا جیسے
کھانا مثلاً روٹی و تازہ گوشت و پرند کا گوشت و تھوڑے سے ترکاری اور کچھ چاول اور کچھ سبزی کھلائیں
اور دودھ بھی اچھی طرح نہین کھایا جاتا لیکن بعضی شخصونکو یہہ تیل ایسا موافق ہوتا
ہے کہ بھوک بڑھجاتی ہے اور جو چاہے سو کھانے کو کھانے لگتے ہین مگر یہہ بات سب کو
نصیب نہین ہوتی ؛

ہفتم اگر مریض کو زیادتی پائی جاے یعنی متلی و درد سر و زبان میلی اور
کا ... پڑے ہوئے پیشاب گہرے رنگ کا ہو تو تیل کا دینا بند کرکے کوئی اپیریئنٹ
دینا اور ہلکی غذا دین ؛

ہشتم بقول ڈاکٹر کاسٹا صاحب

کھانا کھانے کے بعد تو کوئی تیل کا پینا پسند نہین کرتا پس عمدہ وقت اسکے دینے کا
وہ ہے جب ہضم کا فعل ہو چکا ہو ؛ اور تیل کو خوش ذائقہ کرنیکے لیے برف کے پانی یا
کے عرق کے ساتھ دینا بہتر ہی یا ایک گلاس مین کوئی شربت مثلاً شربت شہتوت یا

الکر اسکو کاربونک ایسڈ کے پانی سے سبز رنگ اور جھاگ نکلنے کی حالت میں بھی ایک ٹی
چون فل مچھلی کا تیل اسپون ڈالکر پلا دیں اس سے بالکل مزہ بدل جاتا ہے یا یہ نسخہ بہتر ہے

Rx

نسخہ

کاڈ لور آئیل	ایک اونس	Olei morrhuae ℥j
پیپر منٹ واٹر	آدھا اونس	Aq. menth. pip. ℥ss
ٹنکچر آف اورینج پیل	نصف اونس	Tinct aurantii ℥ss
مکسچر	ساڑھے تین اونس	Mist. acaciae ℥iiiss
آئیل آف گالتھریا	۱۰ قطرے	Olei gaultheriae m x.

M.

سبکو ملا کر ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل

A dessertspoonful
three times a day.

دن میں تین دفعہ دیں

نسخہ بقول ڈاکٹر فاسٹر صاحب ایتھر کے ساتھ ملا کر پینے سے یہ تیل جلد ہضم ہوتا ہے
اسکا نسخہ یہ ہے

Rx

نسخہ

ایتھر	ڈیڑھ ڈرام	Aetheris f. ℥iss
کاڈ لور آئیل	۴ اونس	Olei morrhuae ℥iv

M.

دونوں کو ملا کر ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل

Dessertspoonful
thrice daily.

دن میں تین بار کھانا کھانے سے پہلے دیں

نسخہ بقول ڈاکٹر ٹینر صاحب

جن مریضوں کو روغن ماہی ہضم نہ ہوتا ہو انکے لئے اسکا امبروکیشن بہتر ہے اور جسکے دو نسخہ

نسخہ مالش

لیجئے		Rx.
کاڈلور آئیل	ساڑھے تین اونس	olei morrhuae f. ℥iiiss
ایرومیٹک اسپرٹ آف امونیا	ایک اونس	Sp. ammon. aromat. f. ℥i
ٹنکچر آف اوپیم	آدھا اونس	Tinct. opii f. ℥ss
آئیل آف لیونڈر	۳۰ قطرے	Olei lavandulae m. xxx

سبکو ملا کر اسمیں سے نصف صبح اور نصف شام کو سینہ اور پیٹ پر ملیں ۔

To be rubbed over the chest.

نسخہ دیگر

		Rx.
کاڈلور آئیل	ایک اونس	Olei morrhuae f. ℥i
آئیل آف کجوپٹ	ایک ڈرام	Olei cajuputi f. ʒi
		M.

دونوں کو ملا کر سونے کے وقت سینہ پر ملیں اور اسی میں لنت بھگو کر سینہ پر رکھدیں ۔

To be rubbed over the chest.

ہائپو فاسفیٹ سے علاج کرنا

ہائپو فاسفیٹ کے مرکبات جو اس مرض میں مستعمل ہیں انکی بابت اتنی باتوں کا جاننا مناسب ہوتا ہے۔

اوّل بقول ڈاکٹر چرچ ہال حسب نسخہ مندرجہ ذیل کے طور پر دینا چاہیے۔

نسخہ

Rx.

Sodii hypophos-phitis 1 to 5 parts. — ہائپو فاسفائٹ آف سوڈا ایک سے پانچ حصے

Aquae destil 150 parts — آب مقطر ڈیڑھ سو حصے

Dissolve and filter. A teaspoonful 3 times a day. — نمک کو پانی میں حل کر کے چھان لیں اور بمقدار ایک ٹی اسپون مل دن میں تین چار بار شربت کے ساتھ دیں۔

نسخہ سیرپ آف فاسفائٹ آف سوڈا

Rx.

Sodii hypophos... 5 parts. — ہائپو فاسفائٹ آف سوڈا ... حصے

Sodii carbon crystal 1 part — کرسٹل کاربونیٹ آف سوڈا ایک حصہ

Syr. simplices 500 parts — سمپل سیرپ پانچ سو حصے

Dissolve. One to four tablespoonfuls four times a day. — دونوں نمکوں کو شربت میں حل کر کے سیرپ میں رکھیں اور ایک سے چار ٹیبل اسپون مل تک دن میں چار دفعہ دیں۔

جسکو ملاکر ایک خوراک کرین اور ایسی تین خوراکین تین تین پہر بار دین ۔

For one dose thrice daily.

سوم بقول ڈاکٹر کاگہرسٹا یہ نسخہ بہتر ہے مگر اسکو بخار کی حالت مین نہ دین ۔

نسخہ

Rx.

ہیپو فاسفائٹ آف سوڈا	۸ گرین	Sodii hypophos.
ہیپو فاسفائٹ آف لایم	۸ گرین	Calcii hypophos. aa gr. viii
انفیوژن آف کیسکرا	ایک ڈرام	Infusi Cascarae ℥j

M.

سبکو ملاکر دن مین دو بار کھانا کھانیکے بعد دین ۔

To be taken twice a day after meals.

سفر و تبدیل آب و ہوا

اوّل جو شخص بیٹھے بیٹھے بہت کام کرتے ہین یا جنکو ہرج بہت ہوتا ہے اونکے لیئے تو سفر کرنا مفید ہوتا ہے مگر تیسرے درجہ مین گھر پر ایسی جگہ رکھنا چاہئے جہان کی آب و ہوا مریض کو پسند ہو۔ معمولی مزمن سل مین خشک اور سل کے زکام مین تر اور ایسی ہوا جو صاف و بے بو ہو اور آکسیجن بہت ہو۔ اور پہلے دوسرے درجہ مین خشک و محرک۔ اور مرض مزمن و برنکیل قسم کا سعہ خراشدہ علامات کے سبب تو تر و یکسان و مسکن آب و ہوا بہتر ہوتی ہے ❊

دوم بقول ڈاکٹر لمیارڈ صاحب سمندر کے لول سے پانچ ہزار فیٹ اونچے یہ مرض نہین ہو سکتا بلکہ سل والے مریض وہان جائین تو انکو بھی بہت فایدہ ہوتا چنانچہ اسی سبب سے امریکہ و یورپ مین ایسے مریضون کے رہنے کی جگہ پہاڑون پر مقرر کر دی گئی ہے ❊

سوم بقول ڈاکٹر میکارڈ صاحب پیپرہ کا انفلٹریشن ❊ [illegible] و مزمن و ایک ہی طرف ہو اور نہین دوسری جگہ ہو تو [illegible] مریض کو اپنا جو اوا بھیجنا چاہئے ❊

اور جنکو اول ہی اون ہیماپٹیسس ہو اور وہ مریض بحری سفر کرنے سے اچھے ہو جاتے ہین مگر جنکے غار بہت ہوتے جاتے ہون اور عضلانی کمزوری ہو انکو سفر نہین کرنا چاہئے

❊ انفلٹریشن پیپا نفیوزون کے سفی کہ ایک ہی [illegible] جب کسی ساخت کے خانون کوئی رطوبت آ جاوے تو اسکو انفلٹریشن کہتے ہین ❊

امراض یا علامات عارضی کا علاج

سل میں تکلیف دہندہ علامات یہ ہیں۔ انیمیا و ڈبلیٹی۔ کھانسی۔ اسہا[ل]
تنگی تنفس۔ خون تھوکنا۔ رات کو پسینہ بکثرت آنا۔ وغیرہ پس ہر ایک کا علاج
جدا لکھا جائیگا ÷

انیمیا و ڈبلیٹی

بقول ڈاکٹر طامسن صاحب تمام مرکبات فولاد میں ٹنکچر آف کلورائیڈ آف آئرن کا ...
بہتر ہے کیونکہ اس سے بہت بھوک لگتی ہے۔ نفخ کم۔ بدہضمی رفع۔ اسہال ...
ہو جاتا ہے۔ کاڈ لور آئل وغیرہ ہضم ہونے لگتا ہے۔ اعصاب کمزور عضلات کی ...
کو طاقت بخشتا ہے۔ پسینہ شب کو کم آتا ہے۔ اسباب تپ دق میں بھی مفید ہوتا ...
مگر بعض طبیب کہتے ہیں کہ بشکل قطرے سے ایک ڈرام تک سیرپ آف ایوڈائیڈ آف آ[ئرن]
دن میں تین بار دینا مفید ہوتا ہے ÷

بقول ڈاکٹر ملش صاحب آدھ گرین ایوڈائیڈ آف کیلشیم کا سولیوشن بنا کر دن میں
کئی بار دینے سے بھوک لگتی ہے۔ کھانا ہضم و تنفس باسانی ہوتا ہے۔ کھانسی
و اخراج بلغم و پسینہ آنے میں کمی و طاقت میں زیادتی ہو جاتی ہے اور اگر زیادہ استعمال
کرنے سے بدہضمی ہو جائے تو خود بخود یا مقدار کم کرنے یا تھوڑے روز نہ دینے سے
جاتی رہتی ہے ÷

بقول ڈاکٹر فرر صاحب گائے یا بکری کا کچا گوشت اس ترکیب سے دینا مفید ہے کہ ...
خوب کٹے ہوئے قیمہ پر شکر لگا کر مقدار ایک ایک ٹی اسپون فل تین تین گھنٹے دن میں ...

دن بھر مین دیں ۔

ول ڈاکٹر کیمرن صاحب بل کلاخیر و بچون مین جیسا کہ پیچیدہ اسہال کی زیادتی
سے مریض کمزور ہو جائے تو نظام عصبی کو طاقت اور درد مین تسکین بخشنے کے لیے
یہ نسخہ مفید ہی ۔

نسخہ

Rx.
Zinci oxide gr. ij
Ext. conii gr. j
For one pill, to be taken three times a day.

کسائیڈ آف زنک — ۲ گرین
سٹرا کٹ آف ہملوک — ایک گرین
دونکو ملا کر ایک گولی بنائیں ایسی تین گولی
دن مین تین بار دیں اور رفتہ رفتہ زنک کی
مقدار بڑھا سکتے ہین ۔

کاف یعنی کھانسی

سل کی تکلیف دہندہ کھانسی مین اینوڈین ادویات سے بہت فایدہ ہوتا ہی ۔
بقول ڈاکٹر صدر لین صاحب یہہ نسخے مفید ہین ۔

Rx.

ا نسخہ

Ammonie chlorid gr xxx	۳۰ گرین	نوسادر
Opii pulv. gr ix	۹ گرین	افیون کا سفوف
Digitalis pulv. gr xv	۱۵ گرین	ڈجی ٹیلس پوڈر
Scillae pulv. gr xv	۱۵ گرین	اسکوئیل پوڈر

Divide into thirty pills — one every six hours.

سبکو ملاکر تیس گولیان بنائین اور ایک ایک گولی چھہ چھہ گھنٹہ بعد سل کے پہلے درجہ مین کھانسی کم [illegible] کرنے کے لئے دین ۔

Rx.

۲ نسخہ

Morphiae sulph. gr i	ایک گرین	سلفیٹ آف مارفیا
Syr. ferri iodidi ℥ss	نصف اونس یعنی چار ڈرام	سیرپ آف ایوڈائڈ آف آئرن
Glycerinae f ℥iss	ڈیڑھ اونس	گلیسرین

A teaspoonful two or three times a day.

سبکو ملاکر ایک چارکاچمچ دن مین دو یا تین بار کھانسی ولاغری کم کرنے کو دین ۔

نوعد دیگر

℞

بروومائیڈ آف پٹاسیم — ڈیڑہ ڈرام — Potassii bromid.

کلوریٹ آف پٹاس — ڈیڑہ ڈرام — Potassii chlorate

میوریٹ آف ایمونیا — ڈیڑہ ڈرام — Ammon. muriatis aa ʒiss

سیرپ آف ٹولو — ۴ اونس — Syrupi tolu. ad ℥iv

سب کو ملا کر ایک ایک چار کا چمچ کئی کئی — A teaspoonful every few hours.

گھنٹہ بعد دو ۔

[illegible] لینسٹ نامی اخبار مین لکہا ہے کہ نسخہ مندرجہ ذیل سل کے واسطے اور سل کی

کہانسی مین بہت مفید ہے ۔

نسخہ

℞

سلفیٹ آف اٹروپیا — ایک گرین — Atropiae sulph. gr. i

سلفیٹ آف مارفیا — ۸ گرین — Morph. sulph. gr. viii

ایرومیٹک سلفیورک ایسڈ — ۲ ڈرام — Acid. sulph. aromat. ʒii

پپرمنٹ واٹر اتنا کہ سب [illegible] اونس ہو جاوے — Aquam menth. pip. ad ℥[illegible]

[illegible] دن سے پانچ پانچ قطرے دنمین تین بار ۔ M.

[illegible] پانچ قطرے سوتے وقت دین — Dose 5 drops three daily.

[illegible] ایت کے کنزمشن ہسپتال مین سل کی کہانسی کے واسطے یہ نسخہ مستعمل ہے ۔

[illegible] یا اکثر پرو[illegible] استعمال بذریعہ [illegible] ایکسیر [illegible] کے [illegible] سے بچا [illegible]

[illegible] ہو جبتک اس مقدار کا خیال رکھنا چاہیے ۔

Rx.

نسخہ

Morph. muriatis gr ss. — نصف گرین — میوریٹ آف مارفیا

Acid hydrocyanic dil. m XV — ۱۵ قطرے — ڈائلیوٹ ہیڈروسیانک ایسڈ

Acid muriatic dil. m iiss — ڈھائی قطرے — ڈائلیوٹ میوری ایٹک ایسڈ

Oxymelis scillae ʒss — نصف ڈرام — اوکزیمل آف اسکوئیل

Aq. q.s. ad f℥i — پانی اتنا ملائیں کہ سب ایک اونس ہو جائے

Dose 1 to 2 Drams — انہیں سے ایک سے دو دو ڈرام تک دیں ۔

Rx. بقول ڈاکٹر کاسٹا صاحب کھانسی اور سینہ بہت ہو تو یہ نسخہ دینا بہتر ہے ۔

Liqr. morph. sulph. ℥i — سولیوشن آف سلفیٹ آف مارفیا ایک اونس — نسخہ

Ext. prunus virgin. ℥ii — ۲ اونس — اکسٹراکٹ آف پرونس ورجن

Acid. sulph. dil. ʒii — ۲ ڈرام — ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ

A teaspoonful three times a day. m. — مکسچر بنالیں اور اس میں سے ایک ایک چاء کا چمچہ بھر کر دن میں تین یا چار بار دیں ۔

معدہ کے خراش کے سبب سے کھانسی ہو تو نصف گرین افیون کا ست ایک اونس پانی میں ملا کر دن میں دو بار انہیلیشن کرانے سے بہت فایدہ ہوتا ہے ۔

گلے کی اریٹیشن یعنی خراش دور کرنے کے واسطے تار یا کاربولک ایسڈ یا کریازوٹ یا گرم پانی کا انہیلیشن مفید ہوتا ہے اور سینہ پر خشک سینگی لگانا تنگی تنفس اور کھانسی میں فایدہ مند ہے ۔

ڈیاریا یعنی اسہال

اگرچہ اکثر اسہال مفید ہوتا لیکن جب ہوتا ہے تو مریض کو بہت کمزور کر دیتا ہے پس اس کے لئے نسخہ مندرجہ ذیل دینے چاہئیں ؞

نسخہ ڈرافٹ

Rx.

Olei ricini	۲ ڈرام	کیسٹر آئیل
Tinct. rhei aa f ʒii	۲ ڈرام	ٹنکچر آف روبرب
Tinct. opii m. iv	۴ قطرے	لاڈنم
Aq. cinnamomi f ʒiv M.	۴ ڈرام	سینمن واٹر

To be taken at a draught.

یہ ایک جرعہ ہے ؞

جرعہ مذکور کے بعد یہ نسخہ دیں ؞

نسخہ

Rx.

Acid. nitric dil. m xii	۱۲ قطرے	ڈائیلیوٹ نائٹرک ایسڈ
Tinct. opii m v–x		لاڈنم پانچ سے دس قطرے تک
Syrupi f ʒi	ایک ڈرام	سمپل سیرپ
Aq. cinnamomi f ʒx M.	۱۰ ڈرام	سینمن واٹر

یہ ایک جرعہ ہوا ایسی چار چار یا چھ چھ گھنٹہ بعد دیں

Make a draught to be taken every fourth or sixth hour.

نوعِ دیگر

اکسٹراکٹ آف لاگ اوڈ	۲ ڈرام
چاک کسپچر	۱۲ ڈرام
وائن آف اپیکاکوانا	۲ ڈرام
وائن آف اوپیم	ایک ڈرام

سبکو ملاکر ایک ایک ٹیبل اسپون فل دن میں دو یا تین دفعہ یا اس سے زیادہ دیں ۔ بقول ڈاکٹر گریوسن صاحب یہ نسخہ مفید ہے ۔

نسخہ

ڈالیوٹ سلفیورک ایسڈ پندرہ سے بیس قطرے ۲۰

لاڈنم دس سے پندرہ قطرے

ٹنکچر آف سنکونا اتنا کہ سب ایک ڈرام ہو جاے

یہ ایک خوراک ہے ۔

Rx.
Ext. haematoxyli ʒij
Misturae cretae ʒxij
Vin. ipecac. fʒij
Vin. opii fʒj
M.
A tablespoonful as required

Rx.
Acid. sulph. dil. m xv–xx
Tinct. opium x–xv
Tinct. cinchon. comp. ad fʒj
M.
For one dose.

ڈسپنیا یعنی دقت نفس

خشک سینگی سینہ پر لگانے یا روغن جمال گوٹہ کا لینیمنٹ سینہ پر ملنے سے فایدہ ہوتا ہے
اور کھانسی کے سبب کو تدمی زیادہ ہوگئی ہو تو کلوروفارم کا انہیلیشن یا پانچ گرین
ارسار مسی ایک پاؤ گرم پانی میں ملا کر اسکا اجزے لینا مفید ہے ؛

ہیماپٹیسس یعنی نفث الدم

اسکا بیان اور علاج دیکھنے کے لئے دیکھو صفحہ

نائیٹ سویٹس یعنی رات کا پسینہ

سل والے کو رات کو پسینہ جو بکثرت نکلتا ہے اسکے روکنے کے لئے بلاڈونا اور اٹروپیا
سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے اور اسکے ساتھ مارفیا کا ملا دینا اور بھی اچھا ہے -
اٹروپیا کو گولی یا سولیوشن کی صورت میں بمقدار ساٹھویں حصہ گرین [illegible]
مگر سولیوشن جلد خراب ہو جاتا ہے اسلئے گولی بہتر ہے - اور ہیپوڈرمک سرنج دیا ہو تو
سو [illegible] حصہ گرین اٹروپیا کا دیتے ہیں ؛
بقول ڈاکٹر ہیل صاحب یہ نسخہ بہتر ہے ؛

Rx

نسخہ

Atropine sulph. gr 1/60 - 1/40 — سلفیٹ اٹروپیا ۱/۶۰ سے ۱/۴۰ حصہ گرین

اکسٹراکٹ آف جنٹین ۲ گرین
انکی ایک گولی بناکر دیدین ؛
Ext. gentian gr ij
For one pill

بقول ڈاکٹر ٹینر صاحب یہ نسخہ دینا مناسب این ؛

نسخہ

Rx.

کیا لک ایسڈ ۱۲ اسکروپل
اکسٹراکٹ آف انڈین ہمپ ۵ گرین
کنفکشن آف روز ۱۰ گرین
سبکو ملاکر دس گولیان بنایئن
اور ایک ایک گولی ہر شب سوتے وقت
دین ؛

Acidi gallici 3 ij
Ext. cannabis indica gr v
Conf. rosae gr x
For ten pills. One to be taken every night.

نوع دیگر

Rx

اکسٹراکٹ آف بلاڈونا ایک گرین
سلفیٹ آف زنک ایک گرین
اکسٹراکٹ آف جنٹین ایک گرین
انکی ایک گولی بناکر سوتے وقت دین ؛

Ext. belladon.
Zinci sulph.
Ext. gentian. āā gr j
For one pill at night.

نوع دیگر

سلفیٹ آف زنک ایک گرین
اکسٹراکٹ آف ہارسائرس ۲ گرین
انکی ایک گولی بناکر انکو سوتے وقت دین ؛

Rx
Zinci sulph. gr j
Ext. hyoscyami gr ii
For one pill

ل ڈاکٹر ہیڈن صاحب صبح کو پسینا آتا ہو تو ایک یا دو بار رات کو ڈوور پاؤڈر
اور گنگنے پانی و سرکہ میں اسفنج بھگو بھگو کر بدن کو پونچھنا بہتر ہے +
ِن حرارت زیادہ ہو جاتی ہو تو اسکے روکنے کے لئے دو یا پانچ گرین کونین کا دینا
ہے +

ٹیوبرکیولر لیرنجائٹس

لے بیان کے لئے دیکھو صفحہ

Torpidity and functional derangement of the Liver

ٹارپیڈٹی اینڈ فنکشنل ڈرنجمینٹ آف دی لور

جب جگر کے فعل میں سستی آجائے تو اسے ٹارپیڈٹی اور فعل میں فتور ہو تو فنکشنل ڈرنجمینٹ آف دی لور کہتے ہیں ۞

گرم ملک میں رہنے کے سبب سے اکثر جگر کے فعل میں سستی ہونے سے زرد رنگ کا پاخانہ قبض و قراقر شکم و دیگر علامات بدہضمی کی پیدا ہوتی ہیں۔ چہرہ کی رنگت بہور یا زرد یا پیلی و درہمت مریض کی پست ہو جاتی ہے۔ اگر کھانسی کی زیادتی ہو تو آتشک بیمار سل کے سبب خیال کرتا ہے۔ پسینہ بہت آتا ہے ۞

علاج

ڈاکٹر حیین صاحب Brunnhuson M.D.

فرماتے ہیں کہ ایسے مریضوں میں باسی روٹی۔ خوب پکا ہوا سادہ بکری کا گوشت۔ چپاتی پھلکی۔ انڈے۔ مرغابی۔ تندرست ساگ۔ ہلکی چار پائی کا پلنگ کو دینا اور شدید مریضوں میں۔ آلو۔ چاول۔ ساگودانہ اور دیگر نشاستہ دار سے پرہیز کرانا اور غذا کی حسب ضرورت کھلانا مناسب ہے ۞

دوا ور نمکین مسہلات مثلاً سلفیٹ آف میگنیشیا یا سلفیٹ آف سوڈا۔ ٹارٹریٹ آف پوٹاش۔ ٹارٹریٹ آف سوڈا وغیرہ اور مرکبات پارہ میں سے صرف کیلومل دینا چاہئے۔ الکلی دوا دینا ہو تو کاربونیٹ آف لیتھیا یا کاربونیٹ آف امونیم

…ره کریں کاربونیٹ آف سوڈا کی بابر اثر رکھتا ہے مگر اسکا دینا کبھی کبھی بند کرنا ہے
…بیے کیونکہ زیادہ استعمال کرنے سے ہضم میں فتور ہوجاتا ہے ؀

℞.

نسخہ

Ammoniae chlor. de purif. ℨss — …ریفائنڈ کلورائیڈ آف امونیم نصف ڈرام

Aq. menth. pip. ℥iii — …پیپرمنٹ واٹر ۳ اونس

…دونوں کو ملا کر ایک ایک ڈیزرٹ اسپون فل مکسچر

A dessertspoonful 3 times a day. — …دن میں تین مرتبہ دیں ؀

…عملہ بقیا شے کے مرکبات سے فولاد و کونین سے کچھ فایدہ نہیں ہوتا اور جیسا اوپر …
…گیسکر ملا یہ … یا دکھلیہ کا دینا بہ نسبت مرکبات سنکونا کے بہتر ہے اور … کو سنکیا مفید
…ہے ؀

ڈاکٹر گارڈنر صاحب Dr. Gardner

…معطر از … کر … ٹاٹا فدی اور … پوڈو فائلن ایک نہایت مفید دوا ہے کی
…ایک خوراک سے اکثر مریض اچھا ہوجاتا ہے۔ قلیل المقدار … ہمراہ کچھ …
…یاری … کے … دیتے ہیں۔ اور معمولی علاج … کر … کو …
…کے ساتھ ملا کر رات کو دیں اور صبح کو … دیا جاتا ہے ؀

Typhoid Fever

ٹائیفائیڈ فیور

ٹائیفائیڈ فیور کو گیسٹرک فیور - ٹائیفیا - پیتھوجنک فیور - انٹرک فیور -
انڈوسٹل فیور - اور عربی مین حمی مطبقہ متناقصہ کہتے ہین ◆

یہ ایک چھوت لگنے والا بخار ہے جو حیوانی سمیت سے اکثر جوان آدمیون کو ہوتا ہے
اور دس برس سے کم اور چالیس برس سے زیادہ کی عمر مین بہت کم لاحق ہوتا ہے - اور اسکا
دورہ اکیس یا اٹھائیس روز تک رہتا ہے ◆

اگر سم کا اثر تیز ہو تو سعادت وقتے ہو کر بخار چڑھتا ہے ورنہ کچھ روز سستی رہ کر
دفعتہً سردی معلوم ہو کر بخار چڑھ آتا ہے بہر حال ایک ہفتہ کے بعد تو مریض اسقدر
ضعیف ہو جاتا ہے کہ بستر سے اٹھنا نا ممکن ہو جاتا ہے تشنگی و گرمی ایسی ہوتی ہے
کہ کسیطرح نہین جاتی - رات کیوقت اور بھی مریض مضطرب رہتا ہے نیند مطلق نہین
آتی - شروع مین تین چار زرد یا سبز یا بدبودار دست ہوتے ہین - داہنی
کوکھ کے دبانے سے غڑاہٹ کی آواز آتی ہے اور درد ہوتا ہے - آٹھوین دن سے
[illegible] اور جلد پر سرخ یا گلابی رنگ کے دانے مثل خشخاش نکل آتے ہین جنکو
دبانے سے انکی رنگت دور ہو جاتی ہے [illegible] ایک دو روز بعد یہ دانے زائل ہو جاتے
ہین اور بعدہ انکی جگہ اور نکل آتے ہین اور تا اختتام مرض یہی کیفیت رہتی ہے -
اور کبھی تو بے شمار تعداد مین چہرہ سے پیر تک ہوتے ہین اور گاہے اسقدر کہ جابجا مطلق
خالی جگہ نہین رہتی اور سفیدی دکھائی دیتی ہے اور بعض مین ظاہر بھی نہین ہوتے ◆

تیسرے ہفتہ کے بعد بخار اتر کر صرف کمزوری رہجاتی ہے جس سے بھی مریض کبھی مرجاتا ہے

علاج سے صحت ہو جاتی ہے مگر تیسرے ہفتہ میں بھی بخار نہ چھوڑے تو خراب علامات نمایاں
ہوتی ہیں جنکی فہرست یہ ہے ۔ ہذیان ۔ ہچکیاں ۔ ضعف ۔ بیہوشی ۔ تشنج ۔
کانوں میں جھنجھناہٹ کی آواز آنا ۔ بہرا ہو جانا ۔ سیکرم پر بستر کے زخم ہونا ۔ پتلیاں
پھیل جانا ۔ غفلت ۔ نفخ شکم ۔ اسہال ۔ خشکی زبان ۔ دانتوں پر میل جمنا
نبض کا متواتر ضعیف چلنا ۔ شدت کی کھانسی ہونا ۔ جلد کا رنگ سیاہی مائل
ہونا ۔ طحال کا بڑھ جانا ۔ آخر الدم ضعف یا اعضاء اندرونی کی سوزش سے
مر جانا ۔ یا رفتہ رفتہ چوتھے ہفتہ سے چھٹے ہفتہ تک آرام پانا وغیرہ ۔

اس مرض کے ساتھ جو امراض شامل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہیں ۔ علامات دماغ ۔
گردوں کا اجتماع خون ۔ برنکائٹس ۔ ذات الجنب ۔ ذات الریہ ۔
بعد اندمال مرض گلٹیوں میں مواد ٹیوبرکلس کے انجماد کا میلان ہونا ۔ یا ہرپیز یا
فلی بائٹس یا پیریٹوناٹیس کا ہو جانا ۔

بالفعل وغیرہ سے مریض آرام پاتا ہے تو تین چار ماہ تک اسکی صحت درست نہیں ہوتی اور چار یا
پانچ ہفتہ تک تو کسی کام کے قابل نہیں ہوتے ۔

علاج

ڈاکٹر کلارک صاحب Prof. Clark [illegible] فرماتے ہیں
کہ اگر مرض شدید نہ ہو تو علامات لاحقہ کا علاج کرنے کے سوا اور کچھ دوا کی ضرورت نہیں
ہوتی یعنی اسہال ہو تو عام قابضات مثلاً ٹنکچر آف کائنو یا ٹنکچر آف کٹیکیو یا کبھی افیون
دیں ۔ کھانسی دور کرنے کے لئے دس سے تیس قطرے ٹنکچر آف سنبل [illegible] شکر میں ملا کر کھلانا یا

یا یہ نسخہ دینا اور کبھی آب گرم کے بخارات سنگھانا بہتر ہے ۔

نسخہ

کمپچر آف گوگم ایک ڈرام سے نصف اونس

ٹنکچر آف بالسم آف ٹولو چھ سے دس منم

یہ دوا دو دو یا تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد دیں ۔

every two hours

چونکہ بیچینی جا اس مرض کی ایک بڑی علامت ہے اسکے رفع کرنیکو سرد یا گرم پانی میں
اسفنج بھگو کر جسم پر پھیرنا خوب ہے مگر حرارت کی زیادتی ہو تو بہ نسبت گرم کے سرد پانی بہتر ہو
اور بعض مریضوں میں اسی امر کے لئے ڈوورس پوڈر دینے کی بھی ضرورت پڑتی
اگر جسمی حرارت ایکسو پانچ درجہ تک بڑھ جائے تو مریض کو چھانوے درجہ کے گرم پانی
میں غسل کرائیں مگر کچھ دیر بعد تھوڑا گرم پانی نکال کر اسمیں اتنا سرد پانی ملا دیں
اسکی حرارت اسی درجہ کی ہو جائے ۔ غرضکہ بیس منٹ تک یہ حمام کرا کے بدن
کر پلنگ پر لٹا دیں ۔ اس ترکیب سے مریض کے جسم کی حرارت پانچ درجہ کم ہو جائیگی
جب کئی گھنٹہ بعد پھر حرارت زیادہ ہو جائے تو پھر بدستور سابق غسل کرائیں تاکہ حرارت
کے خطرناک درجہ سے مریض بچ جائے ۔

پاخانہ کی راہ خون آنے کے لئے ٹولوئیڈ ایکسٹرکٹ آف ارگٹ اور جو آنتوں میں سوراخ ہو جائے تو
پوری مقدار میں افیون دینا چاہئے ۔

غذا پرورش کنندہ و سیال مثلاً دودھ و یخنی و اکسٹراکٹ آف بیف وغیرہ دیں
صاف ہوا دار مکانمیں مریض کو رکھنا مناسب ہے ۔

طریق علاج اسپتال بوسٹن Boston City Hospital

سپتال میں داخل ہوتے ہی پلنگ پر رکھیں اور پرورش کنندہ غذا خوب کھلائیں شلا
بیف ٹی گھنٹہ کے اندر دو ہی سیر دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے پلا دیں - الکوہل و ٹرائی سرد
کرا میں اسفنج بھگو کر بدن پونچھیں - اسہال روکنے کو ایک گرین افیون دیجئے تھا ہی
ریں سلفیٹ آف کاپر دیں ہذیان وغیرہ علامات دفع کرنیکو سر پر برف لگائیں -
زدہ لنگی و خشکی دہن رفع کرنیکو گلاب گلیسرین مساوی الوزن ملا کر اسکی کلیاں کرائیں
ضعف مریضوں کو بیس بیس قطرے ڈائلیوٹ نائیٹرک میوریٹک ایسڈ دو دو گھنٹہ بعد پلائیں
ور آرام و نیند و پرورش کا خیال رکھیں ‌‌

ڈاکٹر پیپر صاحب Prof. W. Pepper M. D.

رماتے ہیں کہ ابتداء مرض سے دوسرے ہفتہ میں جب درد و اسہال کم ہوگیا ہو تو مندرجہ
یل نسخہ سے دست بند ہوجاتے ہیں اور مرض میں جلد فائدہ ہوتا ہے اور دودھ وغیرہ
تو دیا ہی جاتا ہے مگر محرکات کی کم ضرورت پڑتی ہے صرف کونیا مقویات کے ساتھ دینا
ہوتا ہے چنانچہ وہ نسخہ یہ ہے ‌‌

نسخہ

ائیٹریٹ آف سلور	چوتھائی گرین $\frac{1}{4}$	Argenti nitratis gr $\frac{1}{4}$
سٹر اکٹ آف بلاڈونا	نصف گرین $\frac{1}{2}$	Ext. belladonnae gr $\frac{1}{2}$
اکسٹراکٹ آف اوپیم	چھٹے حصہ گرین نصف گرین تک	Ext. opii aquosae gr $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{2}$

سے

شکر ملا کر تین گولیاں بنائیں — For one pill - Three
اور ایک ایک گولی دن میں تین بار — times a day after
کھانا کھانیکے بعد دیں ۔ — food.

ڈاکٹر لیبر میسٹر صاحب — Prof. Liebermeister M.D.

فرماتے ہیں کہ اس مرض کا علاج دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک تو آیوڈین اور کیلومل سے
دوسرے کونین سے ۔ پس بطریق اول ایک سکروپل سے ایک ڈرام تک آیوڈائیڈ آف پٹا[illegible]
چوبیس گھنٹہ کے اندر یا اتنے ہی عرصہ میں تین چار بار کر کے آٹھ آٹھ گرین کیلومل دینا
مگر نویں دن سے پیشتر دیا جائے تو بہ نسبت آیوڈائیڈ آف پٹاسیم کے کیلومل سے [illegible]
فائدہ ہوتا ہے ۔ علاوہ بریں سرد حمام بھی کرانا مناسب ہے چنانچہ ساٹھ یا [illegible]
درجہ کے پانی میں جوان آدمی کو دس منٹ رکھیں مگر مریض کمزور ہو تو سات آٹھ منٹ
ہی کافی ہوتا ہے ۔ بعد حمام کے مریض کو خشک چادر میں لپیٹ کر پلنگ پر لٹا دیں اور ایک
وائن گلاس دیں ۔ اگر مرض شدید ہو تو دو دو گھنٹہ بعد حمام کرائیں اور مرض
اوسط درجہ کا ہو تو ہر روز چار دفعہ سے آٹھ دفعہ تک حمام کرانا چاہیے مگر نہایت کمز[illegible]
[illegible] سے سیلان خون ہو یا آنتوں میں سوراخ ہو گئے ہوں تو غسل
[illegible] کرائیں ۔

دوسرا طریق علاج کا کونین کا دینا ہے جو بافائدہ کیا جائے تو بہ نسبت قسم اول کے
مفید ہوتا ہے یعنی دس [illegible] بعد [illegible] آٹھ آٹھ گرین کونین کے [illegible]
یا ایک گھنٹہ کے اندر [illegible] گرین تک کونین دیں اور بعد اس کے [illegible]
گھنٹے کے دوبارہ اسیطرح کونین کا استعمال کریں [illegible] حرارت کم ہو جاتی ہے [illegible]

...قسم کی حرارت ضرور سو درجہ فرنہائٹ پر ہو جاتی ہے لیکن بخار خود بخود کم ہو جاتا ہو تو ...جن سے چندان فائدہ نہیں ہوتا ۔

...ہر دو علاج مذکورہ بالا سے فائدہ نہ ہو تو گیارہ سے بائیس گرین تک ڈجی ٹلس کا ...نوٹ چھتیس گھنٹہ کے اندر دیکر اسکے بعد چالیس گرین کو تین ایک گھنٹہ مین کھلا دین ...اسہال ہو تو قلیل المقدار افیون بار بار دین نفخ ہو تو درد شکم پر سردی لگائین ۔ ...سرد پانی کا حقنہ کرین ۔ پیٹ پر آئیل آف ٹرپن ٹائن ملین ۔ اسہال سے خون جاری ...تو چوبیس گھنٹہ مین دو گرین افیون دین پیٹ پر برف لگائین ۔ بالکل آرام چین ...سے رکھین ۔

ڈاکٹر جےکودجسا Prof. S. Jaccoud M.D.

...فرماتے ہین کہ حتی الامکان مسہل وغیرہ دیکر مریض کو کمزور نہ کرین اگر ضرورت ہی ہو تو ...سیڈلیٹز پوڈر دیکر ملین کرا دین اور ہر چوبیس گھنٹہ مین یہہ مکسچر پلا دین ۔

نسخہ

Rx.

Ext. of cinchona bark	℈ii	۲ اسکرپل	...ٹراکٹ آف سنکونا
Tinct. of cinnamon	ʒii	۲ ڈرام	...چر آف سینمن
Syr. of orange peel	℥i	ایک اونس	...سیرپ آف اورنج پیل
Red Bordeaux wine	℥iii	۳ اونس	...سرخ بوردے شراب
Old brandy	℥i	ایک اونس	...پرانی برانڈی

M. ...سبکو ملا لین ۔ اور یہہ سب چوبیس گھنٹہ کے...

...اسکی مقدار تین چار اونس تک حسب ضرورت بڑھا سکتے ہین ۔

اندر پلا دین ؛

علاوہ دوا مذکور کے دنین دو بار یا زیادہ شوربا ولیمونیڈ وار چھوتا لی حصہ کرین [illegible]
ملا کر دین اور بعد ایک ہفتہ کے دنین دو بار پرورش کنندہ غذا کا حقنہ کرین۔ اور مریض
کے جسم کی حرارت ایکسو دو درجہ پر ہو اور شام کو بہی ایکسو تین درجہ سے زیادہ نہو تو
دنین دو بار اور بحالت زیادتی تین چار بار دین۔ خوشبودار سرکہ مین اسفنج بہگو بہگو کر
بدن پونچہ دین اور بخار ہوتے تک برابر یہ عمل کرتے رہین کیونکہ اس سے مریض کو آرام
اور تازگی معلوم ہوتی ہے۔ اگر بکیلیا یا پمپوژی امراض پیدا ہو جائین تو خشک سینگی
لگائین ؛

ڈاکٹر میفٹ صاحب (2) Dr. A. Maffat

جب مرض کی تشخیص ہو جاے تو آدہا آدہا ڈرام آئیل آف ٹرپن ٹائین انڈے کی [illegible]
مین ملا کر برابر دنین چار چار بار پلاتے رہین اور غذا یخنی دودہ وچکن برا[illegible]
و پھینٹے ہوے انڈے و برانڈی دین ؛

ڈاکٹر وائٹ صاحب (3) Dr. R. P. White

[illegible] سے سب مریضونکو فایدہ ہوتا ہی اور اس مرض مین ایسی کوئی علامة [illegible]
[illegible] مین اس نسخہ کا دینا منع ہو ؛

نسخہ Rx.

آئیل آف ٹرپن ٹائین	۲ ڈرام	ol. terebinth
سولیوشن آف پٹاش	۲۰ ڈرام	Liq. potassa 3ij
مسولج آف گم	۴ ڈرام	mucilag. acaciae 3iv

سیرپ آف وائٹ پاپاورس ۸ ڈرام — Syr. papaveris albi

سیرپ آف اورنج فلاور ۸ ڈرام — Syr. flor. aurantii aa ʒ viii

پھر واٹرا اتنا کہ آٹھ اونس ہو جائے — Aq. camph. q. s. ad f. ℥ viii

اسمین سے ایک ٹیبل اسپون فل چار چار گھنٹہ

بعد بوتل کو ہلا کر پلائین — A tablespoonful every fourth hour.

ڈاکٹر ینفنر صاحب

فرماتے ہین کہ اس مرض کی ہر حالت مین آئیل آف ٹرپنٹائین نہایت مفید ہی چنانچہ بموجب

انکے بعضین ایک تو وہ حالت ہے جسمین بعد دوسرے ہفتہ کے بعض وقت زبان پر خشکی

اور سرخی و بیچ مین ہموار پن ہوتا ہے اور کانٹے پڑ جاتے ہین اور نفخ کی زیادتی ہوتی ہے

پس اس حالت مین دس دس قطرے آئیل آف ٹرپنٹائین دینے دو دو گھنٹہ اور

بعد مین تین تین گھنٹہ بعد دینے سے تمام خوفناک علامات رفع ہو جاتی ہین۔ دوسرے بعد

شدت بخار کے اسہال موجود رہنے کے سبب اصل مرض دیا برس گلینڈ کے زخمون کے

ملائم ہونے مین دیر لگے تو اس دوا سے بہت فایدہ ہوتا ہے یعنی خواہ اسہال مین بار بار

پانچ قطرے سے دس قطرے تک اور تمپنا ئنٹس ہینا بشرطیکہ اسہال ہو تو ایک ڈرام

چھ چھ گھنٹہ بعد دین ❖

Tinct. G. [illegible]

ڈاکٹر والکس صاحب

فرماتے ہین کہ اس مرض مین جب تک زبان صاف ہو دس قطرے سے تیس قطرے تک ٹنکچر

پرکلورائیڈ آف آئرن کو پانی مین ملا کر تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد پلائین یا [illegible]

ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ دین ❖

ڈاکٹر تمیز خان صاحب - Dr. Tamiz Khan

جب بخار کی شدت کے سبب سے حرارت ایکسو پانچ سے ایکسو آٹھ درجہ تک ہو اور نبض فی منٹ ایکسو دس سے ایکسو بیس ضربہ چلے اسہال میں زخم ہو جائیں (یہہ حالت اکثر مرض کے دوسرے ہفتہ میں ہوتی ہے) تو پندرہ گرین سے تیس گرین تک ڈجی ٹیلس کو آٹھ اونس کھولتے ہوئے پانی میں ڈالکر انفیوزن بنالیں اور جب تک نبض کی سرعت اور حرارت کی شدت کم ہو ایک یک اونس ہر دو دو تین تین گھنٹہ بعد پلاتے رہیں مگر اسکے دینے سے نبض فی الفور کمزور ہو جائے تو بند کر دیں یا مرض خفیف قسم کا ہو تو اسکا استعمال ہی نہ کریں مرض خفیف قسم کا یا ہندوستانیوں کو ہو تو

آب گرم میں اسفنج بھگو کر جسم کو پونچھنا - درد سر کی شدت کم کرنیکو بال سر کے منڈوا کر کولڈ لوشن یا برف رکھنا - اور یہہ نسخہ پلانا مناسب ہے

Rx.

نسخہ

Chlorate of Potash	gr. LX	کلوریٹ آف پوٹاش ۶۰ گرین
Cold water	℥ VI – XII	سرد پانی چھ سے بارہ اونس تک
An ounce every two hours.	m	اسمیں سے ایک ایک اونس دو دو یا تین تین گھنٹہ کے فاصلہ سے دیں

[illegible] استفادہ کے لیے بلکہ سیلان [illegible] اور حقیقت میں یہ بات ثابت ہے کہ [illegible] دماغی اضمحلال اور حرارت کی شدت یا اسہال [illegible] موثر یہ رسم ہو جاتا ہے پس اول مرض

ر رکنا بہتر نہین ہے مگر زیادہ دست آنے لگین تو ضرور روکنا چاہیے -
فع بلغم دور کرنیکو ایک یا دو پائنٹ دودہ و آب گرم و قدرے سفوف بادیان ملا کر اسکا
حقنہ کرنا چاہیے یا یہ نسخہ حقنہ کا بہتر ہے ٭

نسخہ حقنہ

Rx.

Asafoetida	ʒss.	نصف ڈرام	ایسا فیٹیڈا
Mucilage of starch	ʒiv.	۴ ڈرام	میوسلیج آف اسٹارچ
Water	Oj	ایک پائنٹ	پانی

M.

This for an enema - ملاکر حقنہ کرین ٭

سہال کی حالت مین لایم واٹر و دودہ اور چار پانچ دفعہ سے زیادہ دست ہونے لگین
د لعاب دار شربت مثلاً کانجی واٹر جیسا ندہ السی یا جوشاندہ خنازی پلائین - نہایت
لیس المقدار ابر کا کونا جس سے مطلق متلی یا قے ہو دست روکنے کے لیے دے سکتے ہین -
گر دستون کے ہمراہ خون آتا ہو تو یہ نسخہ مفید ہے ٭

نسخہ

Rx.

Sulph. acid dil.	mx.	۱۰ منم	ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسڈ
Quinine	grss.	نصف گرین	سلفیٹ آف کونین
Syr. orange peel	ʒss.	نصف ڈرام	سیرپ آف اورنج
Aniseed water	ʒj	ایک اونس	انیسیڈ واٹر

M.

یہ ایک مقدار ہے ایسی دو دو یا تین تین

This every two hours. چار چار گھنٹے کے فاصلہ سے دین ٭

بقول ڈاکٹر حسب صاحبان اگر چوبیس گھنٹہ میں دس سے زیادہ دست آویں اور ضعف ہو
ہو تو قابضات کا استعمال کرنا چاہیے چنانچہ یہ قابض نسخے مفید ہیں ؛

نسخہ

Rx.

ulph. acid aromat. m xxx	۳۰ منم	ایرومیٹک سلفیورک ایسڈ
yr opii sadatav. m x-xx	دس سے بیس منم	لاڈ کراڈ یا پانی سڈیٹوا
q. menth. pip. ℥j	ایک اونس	پیپرمنٹ واٹر

M.

This every four hours.

یہ ایک مقدار ہے ایسی چار چار یا چھ چھ گھنٹہ کے فاصلہ سے پلائیں ؛

نوع دیگر

Rx.

ulph. acid aromat. ʒij	۲ ڈرام	ایرومیٹک سلفیورک ایسڈ
amph. mixture Co. ℥j	ایک اونس	کمپونڈ ٹنکچر آف کیمفر
nnamon water ℥j	ایک اونس	سنیمن واٹر

n ounce every three hours.

جسکو ملا کر ایک ایک اونس تین تین چار چار گھنٹہ بعد دیں ؛

اگر سعدہ ذی تیزابیہ موافق نہوں تو شوگر آف لیڈ ہمراہ ڈوورس پوڈر کے یا نسخہ جند
دیں مگر یہ خیال رکھیں کہ بحالت اختلاط افعال دماغ یا تشنج افیون کا دینا

نسخہ

Rx.

Acetate of lead gr ij	۲ گرین	ایسیٹیٹ آف لیڈ
Acetic acid dil. m j	ایک منم	ڈائیلوٹ ایسیٹک ایسڈ

Morphia gr. ⅙	آٹھواں حصہ	...فیا ایک گرین کا
Camphor water ℥i	ایک اونس	...فر واٹر
M.		
This every four hours-		ایک مقدار ہر ایسی ہی چار ... چھ گھنٹہ کے فاصلے سے ... پینا ۔

...ر فابضات مثلاً گیلک ایسڈ ۔ ٹانک ایسڈ ۔ آئیل آف ٹرپن ٹائن ۔ سلفیٹ آف کاپر ... آف میوسیلج ۔ ایلم وغیرہ بھی دستوں کو روکنے کے لئے دیئے جاتے ہیں علاوہ بریں ... بعض اوقات حقنے جو اسہالات میں نافع ہیں وہ یہ ہیں ۔

نسخہ حقنہ

Rx.		
Mucilage of starch ℥ii	۲ اونس	...ج آف اسٹارچ
Tinct. opii Mx–xxx		... آف اوپیم دس سے تیس منم
M.		
This for an enema.		... کو ملا کر شام کو حقنہ کریں ۔

نوع دیگر

Rx.		
Turpentine oil Mxxx	۳۰ منم	...ل آف ٹرپن ٹائن
Tinct. kino ʒii	۲ ڈرام	...چر آف کائینو
Liquid ext. of opium Mxxx	۳۰ منم	...یڈ اکسٹراکٹ آف اوپیم
Mucilage of starch ℥ii	۲ اونس	...ج آف اسٹارچ
M.		... کو ملا کر بارہ گھنٹہ کے فاصلے سے
This for an enema.		...نہ کریں ۔

بعد چوتھے ہفتہ کے امعا کے زخم نہایت ضعیف اور دست جاری ہون تو نصف گرین نا
آف سلور کی گولی بناکر چھ چھ یا آٹھ آٹھ گھنٹہ بعد دیتے ہین ٭

بیشتر یہ زخم و ٹیپنائیٹس ہو یعنی امعا و قولون ریح سے بھر جائے اور مریض بے چین ہو تو
اسٹمک پمپ کی نلی راہ مبرز قولون تک پہنچانے سے اخراج ریح ہو کر یہ تکلیف رفع ہو
ہے۔ اسکے سوا پیٹ پر تارپینٹائن کے تیل کے سینک کرنا یا پوستہ کی پوٹلس لگانا بھی مفید
اگر درد شکم ہوا اور اسکی زیادتی دبانے سے ہوتی ہو تو جونک بھی لگاتے ہین اور ...
کرتے ہین ٭

تقویت اعصاب کے لئے وائین کا استعمال اسی وقت کرنا مناسب ہے جب قوت لے کر
ہونیکی علامات ظاہر ہون ورنہ دماغ و اعصاب کی طاقت کے لئے سریع الہضم غذا
بہتر کوئی ترکیب نہین ہے۔ تیسرے ہفتہ کے اخیر مین جب نبض سست و کمزور ہو جائے زبان
آنتون پر میل جم جائے تو وائین دینے کی ضرورت پڑتی ہے مگر اس کے دینے سے نبض
سرعت چہرہ پر سرخی زبان پر خشکی آجائے یا ہذیان ہو جائے تو موقوف کردین۔ ا
اقسام وائین سے شیری دودھ کے ہمراہ یا پورٹ وائین یا نہایت ضعف ہو تو برانڈی
بہتر ہے کیونکہ کلارٹ وغیرہ جسمین ترشی ہے انسے دست آنیکا خوف رہتا ہے ٭

اگر پیشاب بند ہو تو کتھیٹر ڈالکر نکالنا۔ اور راہ پیشاب ... کا لیسنڈ کم خارج
... درد کا تصفیہ کرنیکے لئے ... گرم پانی مین غسل کرانا اور اس
دینا بہتر ہے ٭

ع دوا کمپرشن کی یہ ہے کہ باریک سوتی کپڑا تہ تہ کرکے شیر گرم پانی مین بھگو کر خوب نچوڑ کر
... شکم پر ... رکھ کر ... گرمی کم ہو جاوے

نسخہ

Rx.

Nitrate of potash gr xxx — ۳۰ گرین — نائٹریٹ آف پٹاس
Nitric ether ʒ iv — ۴ ڈرام — نیٹرک ایتھر
Infusion of buchu ℥ vii ss. — ساڑھے ساتھ اونس — انفیوزن آف بکو
M. — سبکو ملاکر نصف یا ایک ایک اونس یا چار
Half an ounce every sixth hour. — چھ چھ گھنٹہ بعد دین ؁

اگر ذیل گتھیبین کی علامات یعنی پیشاب مین سرخی یا خون یا البیومن کی موجودگی
ثابت ہو تو کمر پر خشک سینگیان اور رائی لگانا چاہیے ؁
مثانہ سے جریان خون ہونے لگے تو بقول ڈاکٹر لانس معدنی تیزابکا استعمال کرنا مفید ہے
گیا لک ایسڈ و ٹنکچر آف پرکلورائیڈ آف آئرن وغیرہ دیجاتے ہین - برف کے ٹکڑے کھلانا
برف مثانہ مین بھر کر شکم پر رکھنا - نسخ مندرجہ ذیل کا استعمال کرنا بھی مفید ہے ؁

نسخہ

Rx

Acetate of lead gr xxiv — ۲۴ گرین — شوگر آف لیڈ
Acetic acid dil. ʒ i — ایک ڈرام — ڈائلیوٹ ایسیٹک ایسڈ
Distilled water ℥ ii — ۱۲ اونس — ڈسٹلڈ واٹر
M. — سبکو ملاکر ایک ایک ٹیبل اسپون فل
A tablespoonful every half hour. — نصف نصف یا ایک ایک گھنٹہ کے فاصلہ سے دین ؁

نسخہ حقنہ

Rx

شوگر آف لیڈ	۱۵ گرین	Acetate of lead gr xv
ٹنکچر آف افیم	۲۰ قطرے	Tinct. Opii m xx
کانجی واٹر	۱۱/۲ اونس	Congi water 3xxm

سب کو ملا کر حقنہ کریں ◆ — m. This for an enema.

قے و تشنگی وغیرہ سے معدہ کا خراش ثابت ہو تو مسٹرڈ اور گاہے بلسٹر معدہ پر لگانے

ڈائیلوٹ ہیڈرو سیانک ایسڈ ہمراہی بسمتھ یا ہیڈرو کلوریٹ آف مارفیا دینے ۔ برف

کا پانی پلانے سے فائدہ ہو جاتا ہے ۔ اور اگر علامات مذکورہ کی نہایت ہی شدت ہو

مریض چنداں کمزور نہ ہو تو ایپیگاسٹرم پر جونکیں لگا سکتے ہیں ◆

جب معاء میں سوراخ ہو کر پریٹونیل انفلامیشن کی علامات ظاہر ہوں تو بجز افیون کے

اور کوئی دوا نہیں ہے یعنی ایک ایک یا دو دو گرین افیون کی گولی بنا کر دو دو تین تین

گھنٹہ بعد دیں اور جونکیں و پولٹس بھی لگائیں ◆

غذا اس مرض میں شروع سے ہی مقوی و سریع الہضم مثلاً یخنی شوربہ ۔ کانجی و

ٹوسٹ واٹر ۔ بیضہ ۔ اراروٹ ۔ سگو ۔ ٹپے اوکا ۔ شیر برنج پتلا

یا اسنا مغز وغیرہ بقدر ایک ایک گلاس دو دو تین تین گھنٹہ بعد یا حسب رغبت

مریض کے کھلائیں اور ہر قسم کے دینے سے بالکل پرہیز کریں ۔ اور چونکہ

خشکی زبان مریض کھانا نگل نہیں سکتا ہو اسلئے پہلے ایک چمچ پانی جس میں قدرے

لیموں کا نچوڑا ہوا پلا دیں یا قدرے سنجبین زبان پر رکھ کر غذا دیں ۔ صرف دودھ یا دودھ

یا نمین ملا کر پلائیں جب بخار کی شدت کم ہوگئی بعد کمزوری ہو اور مریض کی طبیعت غذا کی طرف مائل ہو تو

جھلی وغیرہ ضرور دیں ۔ تبعد فاقہ کے بھی آٹھ سات دن تک گوشت و دیگر ثقیل
اغذیہ سے پرہیز کرائیں ۔ اور قبل از غذا بیر و بورٹ وغیرہ کا دینا اچھا نہیں ہے ۔
بعض ہو تو روغن بیدانجیر یا آب گرم و صابون کا حقنہ کرنا خوب ہے اور مریض کو کچھ دنوں
تک چلنے پھرنے سے باز رکھنا بلکہ بستر سے بھی حرکت کرنے نہ دینا مناسب ہے ✦

ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب Dr. Mir Ashraf Ali جو
رقمطراز ہیں کہ کونین سے اس بخار میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ۔ مسہل دینا بھی ناجائز
ہے مگر پتلے بدبودار سیاہ رنگ کے اسہال دست آتے ہوں تو ملینات مثل ریوند چینی
یا شیر خشت یا روغن بیدانجیر یا املتاس دینا اور پیٹ پر صرف آب گرم یا گرم پانی
اور تارپین کے تیل کے ساتھ سینکنے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن ملینات کا استعمال بھی
ہوشیاری سے کرنا چاہئے کیونکہ بعض دفعہ ایک دو ڈرام روغن بیدانجیر سے بھی
بہت سے دست آجاتے ہیں ۔ چھوٹی آنتوں کی لعاب دار جھلی کا اجتماع خون دور کرنے کے
لئے شروع میں مقام درد پر تین چار جونک اور چند روز بعد رائی کا پلاستر لگانا
اور کم مقدار گرے پوڈر و ڈوورس پوڈر دینا چاہئے ۔ اسہال کی زیادتی
دور کرنیکے واسطے کمپونڈ چاک پوڈر ود اوپیم یا ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ
دیتے ہیں علاوہ بریں جس مرض کی شکایت ہو اسکا علاج کرنا ۔ مقوی و زود
ہضم غذا کھلانا ۔ پورٹ وائین تقویت کے واسطے دینا ۔ ایک ڈرام
کلوریٹ آف پوٹاشش کو ایک پائنٹ پانی میں ملا کر بالعوض پانی کے پلانا ۔
صاف و ہوا دار مکان میں رکھنا ۔ جس مکان میں مریض ہو وہاں گیلی لکڑیوں
کا دھواں کرنا ۔ بعد صحت پانے کے مریض کے کپڑے و بستر وغیرہ کا جلا دینا مناسب ہے

Typhus Fever

ٹائفس فیور

ٹائفس فیور کو عربی میں حمی طبقہ مترابیدہ کہتے ہیں یہ بخار جو متعدی اور بہ نسبت ٹائفائیڈ فیور کے خراب ہے ہند میں بہت کم ہوتا ہے جب اسکی سمیت اثر کرتی ہے تو ایک دن سے بارہ دن تک سوار سستی و نادرستی طبیعت دکھاتی ہے سردی و عدم اشتہا و تشنگی و درد سر کے کوئی علامت نہیں ہوتی مگر بعدہ شدید بخار دفعتاً چڑھ آتا ہے اور مریض اسقدر جلد ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے کہ تیسرے چوتھے روز اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی زائل ہو جاتی ہے - چھونے سے بدن پر گرمی و خشکی - تشنگی - بے چینی - بےخوابی - درد اعضاء و درد سر خاصکر فرنٹل ہیڈک - قبض شکم - ایک قسم کی غفلت و غنودگی ہوتی ہے سانس سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے ساتویں دن بسبب نقاہت کے ہلا بھی نہیں جاتا زبان نکالنے سے کانپتی ہے - مریض غفلت میں پڑا رہتا ہے جگانے سے جاگتا ہے اور پھر بیہوش ہو جاتا ہے - شب کو ہذیان کی زیادتی ہوتی ہے - رفع یا اسہال نہیں ہوتا - پانچویں و ساتویں دن کے مابین چھوٹے چھوٹے سرخ یا سیاہی مائل دانے شکل شہتوت کے علیحدہ علیحدہ یا باہم ملے ہوئے کمر و بغل اول شکم پر بعدہ سینہ و پشت پر نکلتے ہیں جو دبانے سے زائل نہیں ہوتے ہ

ساتویں روز زبان خشک و بھوری ہو جاتی ہے گیارہویں دن ہذیان و بیہوشی ہو جاتی ہے اور پیشاب بے ارادہ نکلتا ہے یا بند ہو جاتا ہے - اور اکثر مریض دس بیس دن میں مر جاتا ہے یا دو ہفتہ بعد اچھے ہونے کی علامات دکھلائی دیتی ہیں اس مرض کے دور میں اکثر برنکائیٹس یا نمونیا یا دماغ کے انفلامیشن کی علامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں -

جب بیسویں دن سے یا سولھویں دن کے مابین مرض رو بصحت لاتا ہے تو عصبی دماغ کا خلل کم ہونے لگتا ہو اور تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ زایل ہو جاتا ہے نبض باقاعدہ چلنے لگتی ہے کچھ بھوک بھی معلوم ہوتی ہے رات کو نیند آتی ہے اور مریض اچھا ہو جاتا ہے

علاج

ڈاکٹر ہارٹ شارن صاحب H. Hartshorne M.D.

شروع میں کوئی ہلکی ملین دوا مثلاً سائٹریٹ آف میگنیشیا یا ریوند چینی دیکر یوں علاج شروع کریں کہ گھبراہٹ دور کرنیکو مفید نسخے دیں ❊

نسخہ

℞

نائٹرک ایسڈ	۴۰ منم	Acidi nitrici gtt xl
پانی	۴ اونس	Aquae f ℥ iv

اس میں سے ایک یا دو دو ٹیبل اسپون فل تین تین گھنٹہ بعد دینا ❊

M. One tablespoonful every three hours.

نوع دیگر

℞

نائٹرو میوریٹک ایسڈ	نصف درام	Acidi nitro-muriatici f ʒ ss
نائٹریٹ ایتھر	نصف اونس	Spt. aetheris nitrici dulcis f ℥ ss
کیمفر واٹر ساڑھے	۵ اونس	Aq. Camph. f ℥ v ss

اس میں سے ایک ایک ٹیبل اسپون فل دو دو گھنٹہ بعد

M. A tablespoonful every two hours.

دو دو گھنٹہ یا تین تین گھنٹہ بعد دینا ٭
ابتداء مرض میں کثیر المقدار کونین دینا تو مضر ہے مگر جب حرارت جسمی کم ہو جاوے
تو دو دو گرین کونین چار پانچ بار دینا مفید ہے ٭
لہٰذا ابتدا میں گرونل ۔ توسٹ واٹر اور بعدہ طاقت قایم رکھنے کے لئے دو دو
بیف ٹی و چکن براتھ دمبدم پلاتے ہونا چاہئے ٭
دوسرے یا تیسرے ہفتہ میں اکثر مریضوں کو ایک حصہ وسکی یا برانڈی ملا کر اور دو یا تین حصہ
پانی ملا کر دو دو یا تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد اور اسکے درمیان میں ایک ایک یا
دو دو ٹیبل اسپون مل آف بیف یا بیف ٹی دینا مناسب ہے ٭
محرکات کے دینے میں یہ احتیاط چاہئے کہ ہذیان یا نبض کمزور ہو تو اوسکا دینا شروع
کریں اور اوسکے دینے سے نبض آہستہ چلنے لگے یعنی ہذیان کم ہو جاوے تو سمجھو کہ
بیماری رکتی ہے مگر نبض سریع و سخت و سر گرم و جلد خشک و ہذیان کی زیادتی و سختی
ہو تو اوسکی مقدار کم یا بالکل بند کر دیں ۔ نمونیا کا علاج یوں ہے کہ کندھوں کے
درمیان خشک سینگیاں اور سینہ پر پلستر لگائیں ٭
ڈاکٹر چارٹرس صاحب Prof. M. Charteris
فرماتے ہیں کہ مرض کے پہلے دور میں ایک ایمیٹک دینے سے فائدہ ہوتا ہے اور جب مرض کا
حملہ شروع ہو تو تیس سے چالیس گرین تک ڈوور پوڈر کھلانے اور نیم گرم پانی کا
نتقر کرنے سے تبعض رفع ہو جاتا ہے ۔ بعدہ مسٹرڈ و دیگر سردی لگانا ۔ دل کی
پہلی آواز نہ سنائی دیتی ہو اور نبض کمزور ہو تو محرکات کا استعمال کرنا مناسب
ہے اگر زردی ہو تو مریض کو جگا کر محرک دوا دینا ۔ عصبی خراش یعنی بیخوابی ہو تو یہ سکن

نسخہ

Rx.

Hydrochloric acid dil. ♏XX	۲۰ منم	ڈالیوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ
Nitric acid dil. ♏X	۱۰ منم	ڈالیوٹ نیٹرک ایسڈ
Nitric aether ♏XL	۴۰ منم	نائٹرک ایتھر
Liq. cinchona ♏XXX	۳۰ منم	لائکر آف سنکونا
Decoction scoparii ℥i	ایک اونس	ڈیکاکشن آف اسکوپیریا

This after three hours.

یہ ایک مقدار ہے ایسی تین تین گھنٹہ بعد پلایا کریں ۔

نوع دیگر

Rx.

Quinine gr. ss.	نصف گرین	سلفیٹ آف کونین
Sulph. acid dil. ♏XX	۲۰ منم	ڈالیوٹ سلفیورک ایسڈ
Sulph. aether ♏XV	۱۵ منم	سلفیورک ایتھر
Syr. of orange peel ʒss	نصف ڈرام	سیرپ آف اورنج پیل
Decoc. of scoparii ℥i	ایک اونس	ڈیکاکشن آف اسکوپیریا

This every two hours.

یہ ایک مقدار ہے ایسی دو دو گھنٹہ بعد دیں ۔

اخراج سمیت دو الکلائن سالٹ کی کمی پورا کرنے کیلئے کلورائیڈ آف سوڈیم ۱۰ گرین کی مقدار سوڈا ۔ شورہ ۔ جتنا مریض پینا چاہے پانی ۔ نائٹریٹ ۔ چار ۔ شورہ بعد نسخے دیں ۔

Rx. نسخہ

Chlorate of potass gr. LX	۶۰ گرین	کلوریٹ آف پٹاس
Aquae Oj	ایک پائنٹ	پانی

M.

To be given as required.

اسمین سے تھوڑا تھوڑا پلائین ✦

Rx. نوع دیگر

Acid tartrate of potash 3i-ii	ایک سے دو ڈرام	ایسڈ ٹارٹریٹ آف پٹاس
Boiling water Oj	ایک پائنٹ	کھولتا ہوا پانی
Lemon peel q.s.	حسب ضرورت	لیمو کا چھلکا
White sugar q.s.	حسب ذائقہ	شکر سفید

M.

To be given as required.

سبکو ملاکر حسب خواہش تھوڑے تھوڑے پلائین ✦

یوریا وغیرہ خارج کرنیکے لیے مسہل کا استعمال کرنا بھی بہتر ہے مگر مریض نقیہ ہو تو صرف ملینات مثلاً روغن بید انجیر یا کمپونڈ ربرب پل یا حقنہ ہی کافی ہے اور بخیال نقاہت مسہلات سے احتراز کرنا اولے ہے ✦

ابتداء مرض مین مقیات سے فایدہ ہوتا ہے مگر مریض کمزور ہو یا اسکو بخار اور بحار ہو تو دین اور بہت ہی ضرورت ہو تو ایکا کوانا وائن پلاکر قے کرائین ✦

زیادہ پسینہ آنا بھی مضر ہے اسلیئے ہلکے معرقات مثلاً نایٹرک ایتھر یا سولیوشن آف ایسیٹیٹ آف امونیا کا اسقدر استعمال کرین کہ بدن نم رہے ✦

عفونت دفع کرنیکے لیے ایک ڈرام سیوری ایسڈ ایک پائنٹ گرم پانی مین ملاکر اسسے

دنہیں دو تین بار بدن پونچھ دیا کریں ؛

ابتداء مرض سے قوت بحال رکھنے کے لئے مقوی و سریع الہضم غذا اوقات معینہ پر کھلائیں اور مرض کے چوتھے روز سے تیرہ چودہ دن تک چار چار گھنٹے بعد دیں یعنی کہ مریض سوتا ہو تو جگا کر کھلا دیں مگر ایام بحران کے قریب سوتے ہوئے مریض کو جگانا نہ چاہئے ۔ جب مریض نہایت کمزور اور اوسکی زبان میلی کانپتی ہوئی نبض تیز و ضعیف ہو جائے دل کی ٹپکی آواز کم یا بالکل سنائی دے یا دیگر امراض کی شرکت ہو یا جلد کی رنگت سیاہ ہونے لگے ۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں تو چار کافی و الکحل کا استعمال ہوشیاری سے مناسب ہے ۔ ہذیان میں الکحل دینے سے فائدہ ہو تو دیں ورنہ موقوف کر دیں

اس مرض میں یہ محرکات استعمال کئے جاتے ہیں ۔ برانڈی ۔ برانڈی مکسچر ۔ رم ۔ پورٹ ۔ شیری ۔ ہندوستانی دواتشہ شراب ۔ پس انمیں سے دو ڈرام سے ایک اونس تک ایک ایک دو دو گھنٹہ بعد اکثر اسپرٹ انک بیضی یا چکن براتھ کے ساتھ دیتے ہیں اور کبھی ایتھر کا فور یا ایتھر یا مشک وغیرہ کے شامل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جب بسبب نقاہت بیہوشی کے مریض نہ کھا سکے تو محرکات کا حقنہ کیا جاتا ہے ؛

درد سر ہذیان کے بعد ہو ۔ جی متلائے ۔ نبض بھری ہوئی چلے تو فوراً دو تین گرین دیں دو تین ٹیبل اسپون ہیلیبوریا کا لیمنٹ ملا کر پلائیں اور جو چہرہ و چشم پر سرخی و بدن پر گرمی و خشکی و درد سر کی زیادتی ہو تو گردن پر خشک سینگیاں اور اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو سر منڈوا کر شانہ میں برف بھر کر سر پر لگائیں یا آئس سرد کے ترشح دیں یا نوجوان کو ایک دو جونک لگائیں بلکہ گرم پانی سے سینکیں اور درد سر باعث ضعف و کمی خون کے ہو تو محرکات بہت ہوشیاری سے دیں ؛

بیہوشی و غفلت میں تیز قہوہ و کافور دینا خشک سینگیاں یا رائی کا پلسٹر لگانا۔ گرم سینک کرنا مناسب ہے۔ اور بحالت غفلت مثانہ میں پیشاب کا ہونا ثابت ہو تو بذریعہ کیتھیٹر نکالنا چاہیے ؁

Typho-Malarial Fever

ٹائیفو ملیریل فیور

علاج

ڈاکٹر ولیمس صاحب Dr. Williams -

زمانے میں گر بعد تجربہ کے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس مرض میں کونین دینا مضر ہے
بس ضرور علاج اسہال و نفخ و درد امعا کا بند کرنا ہے چنانچہ انکے لیے دس گرین
ڈوورس پوڈر کئی کئی گھنٹہ بعد دینے سے بھی دست بند نہوں تو افیون و شوگر آف
لیڈ و سب نائٹریٹ آف بسمتھ و گلیسرین کا حقنہ کرتے ہیں - اور زبان کی سرخی
و خشکی و نفخ و درد شکم سے امعا کی سوزش شدید ظاہر ہو تو کلوریٹ آف پٹاسس
کا سیچوریٹڈ سولیوشن بمقدار ایک ایک ٹی اسپون فل ایک ایک دو دو تین تین
گھنٹہ بعد دینا مناسب ہے - بخار میں کینین سے کچھ فایدہ نہیں ہوتا - زود ہضم غذا
کھلانا اور محرکات کا استعمال کرنا ضرور چاہیے ؛

ڈاکٹر ہارلو صاحب Dr. Harlow

زمانے میں گر اس بخار میں الکوہل دینے سے پرہیز کرنا چاہیے الکوہالک اسٹمولنٹ کا دینا مناسب
نہیں صرف آخری درجہ میں کاربونیٹ آف امونیا و برانڈی کی ضرورت پڑتی
ہے اور یہ نسخہ بھی اسمیں مفید ہے ؛

Rx نسخہ

Quiniae sulph.	gr xxx	۳۰ گرین	کونین
Olei piperi nigri	ℳ xxiv	۲۴ منم	آئل آف بلیک پیپر
Acidi sulph. aromat.	ʒj	ایک ڈرام	ایرومیٹک سلفیورک ایسڈ
Syr. simplicis	℥iv	۴ اونس	سمپل سیرپ
Alcoholis	℥j	ایک اونس	الکوحل

M.

A tablespoonful every hour –

اس میں سے ایک ایک ٹیبل اسپون فی گھنٹہ
گھنٹہ بعد اور جب دوا ختم ہو جائے تو دو دو
گھنٹہ بعد دیں۔

Tic Douloureux / facial neuralgia پر

ٹکڈلرو

اسکو فیشیل نیورالجیا بھی کہتے ہین دماغ کے پانچوین جوڑے عصب کا شدید درد ہے جو اکثر ایک جانب خاصکر داہنی طرف بتدریج شروع ہو کر شدید ہو جاتا ہے۔ جب عصب مذکور کی پہلی شاخ مین ہو تو چشمخانہ کے بالائی کنارہ پر دوسری شاخ مین ہو تو چشمخانہ کے زیرین کنارہ و لب و رخسارہ و ناک پر۔ تیسری شاخ مین ہو تو زیرین جبڑے دانتون مین درد ہوتا ہے۔ اس درد کے ساتھ حقیقت مین تو کچھ فتور نہین ہوتا صرف نازک پر کبھی جلن معلوم ہوتی ہے مگر ٹہر ٹہر کر درد ایسا زور سے ہوتا ہے جیسے کوئی چیرتا ہو یا کوئی تیز چیز اندر گھستی ہو ❖

علاج

ڈاکٹر انسٹی صاحب E. Anstie M.D.

فرماتے ہین کہ کوانٹرا دی نیشن دو اکثر پرانکا غذائیت بخش و مقویات ادویہ مثلاً مچھلی کا تیل وغیرہ و دیگر فرضی اشیا ابتداء مرض سے ہی کھلانا۔ مارفیا یا اٹروپیا کی پچکاری ہی زیادہ جلد کرنا اس مرض کا عمدہ علاج ہے ❖

جب مارفیا کی پچکاری دینا ہو تو شروع مین بمقدار ⅛ حصہ گرین دن مین دو بار دین اور پھر رفتہ رفتہ ¼ گرین سے ½ گرین تک بڑھا دین اور جب فائدہ ہونے لگے تو بتدریج گھٹا دین۔ اور مارفیا سے فائدہ نہ ہو تو ⅟₆₀ حصہ گرین کی مقدار مین اٹروپیا کی پچکاری کرین ❖

فایدہ ۔ ڈاکٹر نسنی صاحب کا قول ہے کہ اس سے کم مقدار استعمال کیا جائے تو فایدہ یقین ہوتا مگر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مقدار زیادہ دینے سے خصوصاً اثر پیدا کی جو مہلک زہر ہے اور شرط امید کیا ہے پچاسویں ساٹھویں حصہ گرین تک میں پچکاری کرینگے لیے لکھا ہے ۔

ڈاکٹر کاسٹا صاحب Prof. J. M. Da Costa

فرماتے ہیں کہ دن کو اس نسخہ کا دینا مفید ہے ۔

نسخہ

℞

Liq. potass. arsenitis, gtt v.	۵ قطرے	لائقر پوٹاشن
Syr. rhei arom. f ʒ j	ایک ڈرام	ایرومیٹک سیرپ آف روبرب
M. For one dose, three daily.		یہ ایک خوراک ہے ایسی تین خوراک کھانا کھانے کے بعد دیں ۔

رات کو تھیلی میں نمک بھر کر اور گرم کر کے گدی پر سینک کریں اور یہ گولی کھلائیں ۔

نسخہ

℞

Ext. belladon. gr ¼	چوتھائی گرین	اکسٹراکٹ بلاڈونا
Ext. hyoscyami	ایک گرین	اکسٹراکٹ آف ہایوسایمس
Ext. colocynth. comp.	ایک گرین	کمپوزٹ اکسٹراکٹ آف کالوسنتھ
Pulv. zingiberis	ایک گرین	جنجر پوڈر
āā gr. j. M. Make a pill.		سبکو ملا کر ایک گولی بنائیں ۔

Dr. N. Denton. ڈاکٹر ڈینٹن صاحب

کور فارم یا دوا مندرجہ ذیل کے لگانے سے شدت درد کی جاتی رہتی ہے ◆

نسخہ

Rx.

Olei camph. f ℥ ij	دو اونس	کیمفر آئیل
Pulv. opii ℈j	ایک اسکروپل	افیم پوڈر
Potassi nitratis gr xx	۲۰ گرین	نائیٹر

Mix well in a mortar and apply. — سب کو کھرل میں ڈالکر خوب ملا کر مقام ماؤف پر تھوڑا تھوڑا لگائیں ◆

W. Munro M.D. — ڈاکٹر منرو صاحب

چونکہ مقام ماؤف کی خونی آور دست سکڑنے سے یہ مرض ہوتا ہے بدیں وجہ کیلئے ہاٹ
کار بہ حل کر کے دو ایک قطرے آنکھ میں ڈالنے سے فایدہ ہو جاتا ہے ◆

Prof. F. V. Niemeyer M.D. — ڈاکٹر نیمیر صاحب

فرماتے ہیں کہ بیلگنس پل (جسکا دنیا ملک جرمنی میں بھی اس مرض میں مفید سمجھا گیا ہے)
درحقیقت مفید ہیں اور انکا یہ نسخہ ہے ◆

نسخہ

Rx.

Ext. hyoscyami	۱ اسکروپل	اکسٹراکٹ آف ہایوسس
Zinci oxidi, aa ℈j	۱ اسکروپل	اوکسائیڈ آف زنک

Divide in forty pills. Begin with one pill morning & evening. — دونوں کو ملا کر چالیس گولیاں بنائیں اور صبح شام ایک ایک گولی دیں پھر رفتہ رفتہ بیس گولی تک دیں ◆

ڈاکٹر ٹینر صاحب

نسخہ

℞.

Ext. belladonnae, ڈیڑھ ڈرام — ایکسٹراکٹ آف بلاڈونا

Ext. opii aa ℥iss. ڈیڑھ ڈرام — ایکسٹراکٹ آف اوپیم

Glycerinae f ℥iv ۴ ڈرام — گلیسرین

Ext. papaveris ℥iss ڈیڑھ اونس — ایکسٹراکٹ آف پاپیور

m.

To be painted over the affected part.

سبکو ملالیں انمیں سے تھوڑا سا مقام ماؤف پر لگا کر اسکے اوپر ٹشو پیپر رکھ کر السی کا گرم پولٹس رکھدیں یا فلالین سے سینکیں ۔

نوع دیگر

℞.

Aconitiae gr ij ۲ گرین — اکونائیٹا

Alcoholis gtt xx ۲۰ قطرے — الکحل

Adipis ℥j ایک ڈرام — چربی

m.

To be smeared over the painful nerve.

اکونائیٹا کو الکحل میں حل کرکے چربی خوب ملالیں اور عصب وقت کے راستہ میں تھوڑا بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ خیال رکھ کے ذرہ ایکبار لگائیں کہ ذرا بھی وہ جگہ چھلی ہوئی نہو

ڈاکٹر ویکس صاحب Waakes M.D.

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید جانتے ہیں ۔